

Malvatricin[®]

Tirotricina 1 mg - Quinosol 0,7 mg - Benzocaína 5 mg

Malvatricin Pastilhas

Tirotricina 1 mg – Quinosol 0,7 mg – Benzocaína 5mg

Precauções: Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob orientação médica ou odontológica.

Modo de usar: Dissolver uma pastilha na boca, quatro vezes ao dia ou de acordo com as instruções do dentista ou do médico. Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso. Conservar as pastilhas bem fechadas, em temperatura ambiente (15 a 30°C) e protegidas da luz solar. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou odontológica.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Indicações: Afecções da boca, aftas e dor de garganta.

Composição: Cada pastilha contém: Tirotricina 1 mg; Quinosol 0,70 mg; Benzocaína 5 mg. Excipiente q.s.p. 1 pastilha.

Excipientes: Ácido Fumárico, Aspartamo, Dióxido de Silício Coloidal, Essência de Menta, Estearato de Magnésio, Etil Maltol, Isomalt, Manitol, Mentol, Povidona K-30, Tintura de Malva, Corante Azul Brilhante, Corante Amarelo Quinolina e Água Deionizada.

Contra-indicações: É contra indicado em pacientes alérgicos a este medicamento. "Este medicamento é contra-indicado na faixa etária abaixo de 6 anos de idade".

Fabricado por: Laboratório Daudt Oliveira Ltda. Rua Simões da Mota, 57. Rio de Janeiro – RJ CNPJ: 33.026.055/0001-20. Indústria Brasileira 070211/006. MS. 1.0143.0024.016-9. Farm. Resp.: Michele Vieira Espindola CRF/RJ 17419.

