

Maresis®

Solução de cloreto de sódio 0,9% - estéril

APRESENTAÇÃO

Spray nasal em jato contínuo - solução de cloreto de sódio 0,9% - embalagem contendo um frasco spray com 100 ml + duas válvulas (bicos) removíveis + um limitador nasal externo.

VIA NASAL USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada ml da solução nasal contém:
cloreto de sódio 9 mg
Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Maresis® é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados e de outras alterações respiratórias, tais como rinite, sinusite e no pós-operatório de cirurgias nasais.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Maresis® age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua eliminação.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar Maresis® se tiver antecedentes de hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Maresis® é uma solução isotônica de cloreto de sódio, estéril, sem vasoconstritor e livre de conservantes. Não altera a fisiologia das células da mucosa nasal e dos seios da face.
- Maresis® vem acompanhado de duas válvulas (bicos) removíveis para uso pediátrico e adulto, um limitador nasal externo e uma tampa.

- Não há restrição de faixa etária para o uso de Maresis®.
- Em bebês, o tempo de aplicação de spray deve ser curto, de modo a não prejudicar a sua respiração.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Maresis® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas


Líquido estéril límpido, incolor, inodoro e com sabor levemente salgado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

- Destampe o frasco;
- Selecione entre a válvula 1 (uso adulto) ou a válvula 2 (uso pediátrico), conforme necessidade;



- Encaixe a válvula selecionada na parte superior do frasco;
- Introduza a válvula aplicadora na narina;
- Com o dedo indicador, pressione a base da válvula, mantendo o tempo necessário para uma higienização eficaz;
- Em bebês, o tempo de aplicação do spray deve ser curto;
- Repita a operação conforme necessidade;
- Se necessário, assoe o nariz para eliminar as secreções já fluidificadas;
- Recomenda-se secar a válvula aplicadora após a utilização;
- Após o uso, tampe o frasco;
- Como medida de higiene, recomenda-se o uso individual do produto;
- Não introduza objetos no orifício de saída do líquido, para evitar danos à válvula.
- Caso queira usar o limitador nasal externo, encaixe-o na válvula escolhida. As duas válvulas podem ser utilizadas com o limitador nasal externo. Considere a imagem abaixo como instrução;



Posologia

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC ANVISA nº199/2006. AFE nº 1.00390.6

Farm. Resp.:
Dra. Marcia Weiss I. Campos
CRF - RJ nº 4499

Notificado por:

FQM

FARMOQUÍMICA S/A
Rua Viúva Cláudio, 300
Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 33.349.473/0003-10
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Esta bula foi atualizada em 31/10/2013.

500003252/13-00
185 X 210
AR121013 FQM

