

Maxilerg Colírio

Diclofenaco sódico 0,1%

Antiinflamatório não-hormonal

Uso adulto

Composição por ml

Diclofenaco sódico 1 mg

Veículoq.s.p..... 1 ml

Informação técnica

O diclofenaco sódico, um derivado do ácido fenilacético, é um antiinflamatório não esteróide, inibidor da enzima ciclo-oxigenase ocasionando inibição da síntese de prostaglandinas em níveis central e periférico. Reduz a atividade das prostaglandinas, inibindo a síntese de outros mediadores locais da resposta inflamatória. Como analgésico, bloqueia a geração do impulso da dor por ação periférica e inibe a síntese de mediadores da dor (estímulo mecânico e químico).

Em aplicação tópica ocular, o diclofenaco sódico é eficaz no alívio dos processos inflamatórios do segmento anterior do olho e para prevenir a inflamação pós-operatória, quando aplicado antes da cirurgia ocular.

Indicações:

Reações inflamatórias do segmento anterior do globo ocular: conjuntivite crônica, ceratoconjuntivite, condições pós-traumáticas dolorosas da córnea e conjuntiva, no pré e pós-operatório de cirurgia ocular, úlceras marginais da córnea, ceratite fotoelétrica e episclerites. Adjuvante no tratamento da inflamação na ceratite do estroma corneano por herpes.

Contra-indicações:

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Pacientes com crises de asma, urticária ou rinite precipitadas por ácido acetilsalicílico ou outros agentes antiinflamatórios não-esteróides.

"Não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, com exceção de casos de artrite juvenil crônica."

Precauções e Advertências:

Não foram realizados estudos sobre a utilização deste produto na gravidez, lactação ou em crianças.

Deve ser administrado com cautela em pacientes com lesões gastrintestinais ativas ou história de lesões gastrintestinais recorrentes.

Recomenda-se aos usuários de lentes de contato suspender o seu uso durante o tratamento com Maxilerg (diclofenaco sódico).

Reações adversas:

Ocasionalmente, pode ocorrer sensação de ardor ou irritação transitória imediatamente após a aplicação.

Posologia:

A dose deve ser estabelecida a critério médico, de acordo com a gravidade da inflamação.

Instilar 1 gota no saco conjuntival, 4 a 5 vezes por dia.

Apresentação:

Solução oftálmica estéril - frasco conta-gotas contendo 5 ml

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA"

Maxilerg (Diclofenaco sódico 0,1%): Reg. MS nº 1.1725.0030.001-0

Responsável Técnico: Dr. Morio Sato - CRF-SP: nº 0381

Nº de lote, data da fabricação e validade: vide cartucho

Fabricado por:

LATINOFARMA INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS LTDA.

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia – SP

C.N.P.J. nº 60.084.456/0001-09 - Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor (11) 4702 5322