

Catarinense

MELAGRIÃO®

Mikania glomerata e Associações

Medicamento Fitoterápico

Nomenclatura e parte da planta utilizada:

Acônito

Aconitum napellus L. – Ranunculaceae – raiz

Agrião

Nasturtium officinale R. Brown – Cruciferae – planta inteira

Bálsamo de Tolú

Myroxylon balsamum (L.) Harms – Leguminosae – resina

Guaco

Mikania glomerata Spreng. – Compositae – folha

Ipecacuanha

Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. – Rubiaceae – raiz

Poligala

Polygala senega L. – Polygalaceae – raiz

Forma farmacêutica e apresentação:

Xarope – cartucho com frasco plástico âmbar x 150ml

VIA ORAL

USO PEDIÁTRICO E ADULTO

Composição:

Cada ml do produto contém:

Alcooatura de Agrião	0,04666 ml [a]
Ext. Fl. de Guaco	0,00830 ml [b]
Ext. Fl. de Poligala	0,00830 ml [c]
Soluto Conc. de Bálsamo de Tolú	0,00800 ml [d]
Ext. Fl. de Ipecacuanha	0,00042 ml [e]
Ext. Fl. de Acônito	0,00008 ml [g]

Excipientes: açúcar, mel, benzoato de sódio, metilparabeno e água purificada.

Concentração dos princípios ativos:

[a] equivalente a 14mcg de fenilpropanóides em ácido clorogênico (marcador)

[b] equivalente a 25mcg de cumarina (marcador)

[c] equivalente a 83mcg de saponinas em derivados do ácido oleonólico (marcador)

[d] equivalente a 32mcg de ácido cinâmico (marcador)

[e] equivalente a 4,2mcg de alcalóides em emetina (marcador)

[g] equivalente a 0,4mcg de alcalóides em aconitina (marcador)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

Ação do medicamento

Melagrião® Xarope é um produto fitoterápico que associa a atividade expectorante da Poligala, do Guaco e da Ipeca com a atividade antitussígena do Acônito e também do Guaco. Possui ainda em sua composição o Agrião e o Bálsamo de Tolú que são modificadores das secreções, auxiliando na eliminação do catarro.

O tempo médio de início da ação do medicamento vai depender das condições de cada organismo.

Indicações do medicamento

Antitussivo e expectorante, no tratamento das bronquites alérgicas e estados gripais com comprometimento das vias respiratórias, com tosse, tosse seca ou tosse produtiva.

Riscos do medicamento

O Melagrião® Xarope não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Não se recomenda o uso do Melagrião® Xarope em casos de úlceras gástricas e intestinais e na doença renal inflamatória.

Não recomendamos o uso de Melagrião® Xarope durante a gravidez e lactação, e também não por diabéticos devido a presença de açúcar na sua formulação.

Interações medicamentosas

Até o momento não são conhecidas interações medicamentosas do Melagrião® Xarope com outros medicamentos ou substâncias.

Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista [Categoria C].

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Modo de uso

O Melagrião® Xarope apresenta-se como um líquido xaroposo, levemente turvo, de coloração amarela, levemente acastanhada e com odor melífero. Seu sabor é doce, melífero.

A posologia foi estabelecida da seguinte maneira:

Adultos:

1 colher das de sopa (15ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 7 a 12 anos:

1/2 colher das de sopa (7,5ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 3 a 6 anos:

1 colher das de chá (5ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 2 a 3 anos:

1/2 colher das de chá (2,5ml) de 3 em 3 horas.

O xarope deve ser ingerido por via oral.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Para consulta do prazo de validade: vide cartucho.

Reações adversas

Estudos clínicos na dose usual não mostraram efeitos colaterais.

Conduta em caso de superdosagem

A administração de altas doses pode levar a distúrbios gástricos, vômitos ou diarreia.

Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.

Cuidados de conservação e uso

Melagrião® Xarope deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C].

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE:

Melagrião® Xarope é um fitoterápico eficaz com ações seletivas nas vias respiratórias. Os componentes fitoterápicos presentes no Melagrião® Xarope propiciam ações antitussígenas e antiinflamatórias.

O Melagrião® Xarope atua nas terminações eméticas sensíveis da mucosa gástrica aumentando a fluidificação da secreção brônquica, responsável pela expectoração e descongestionamento das vias respiratórias. O mel presente na formulação é um coadjuvante, pois tem reconhecidas propriedades demulcentes, agindo como emoliente das vias respiratórias afetadas pela bronquite e suas manifestações.

Resultados de eficácia:

Até o momento não foram encontrados dados de percentagem de cura ou prevenção do produto no uso como antitussígeno e expectorante.

Indicações

Antitussígeno e expectorante, no tratamento das bronquites alérgicas e estados gripais com comprometimento das vias respiratórias, com tosse, tosse seca ou tosse produtiva.

Contra-indicações

O Melagrião® Xarope não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. Não se recomenda o uso do Melagrião® Xarope em casos de úlceras gástricas e intestinais e na doença renal inflamatória.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto
O xarope deve ser ingerido por via oral.

Melagrião® Xarope deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C], evitando-se local quente.

Posologia

A posologia foi estabelecida da seguinte maneira:

Adultos:

1 colher das de sopa (15ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 7 a 12 anos:

1/2 colher das de sopa (7,5ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 3 a 6 anos:

1 colher das de chá (5ml) de 3 em 3 horas.

Crianças de 2 a 3 anos:

1/2 colher das de chá (2,5ml) de 3 em 3 horas.

Advertências

Não recomendamos o uso do Melagrião® Xarope durante a gravidez e a lactação, e também não por diabéticos devido a presença de açúcar na sua formulação.

Categoria C: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento só deve ser utilizado por via oral.

Uso em pacientes idosos, crianças e outros grupos de risco

Melagrião® Xarope é bem tolerado por pacientes idosos e nas doses terapêuticas descritas na posologia, ainda não são conhecidas a intensidade e frequência das reações adversas ou efeitos colaterais relevantes.

Não deve ser utilizado durante a gravidez, lactação e para pacientes com hipersensibilidade à droga ou a seus componentes, e também não por diabéticos devido a presença de açúcar na sua formulação.

Interações medicamentosas

Até o momento não são conhecidas interações medicamentosas do Melagrião® Xarope com outros medicamentos ou substâncias.

Reações adversas

Estudos clínicos na dose usual não mostraram efeitos colaterais.

Superdose

Se ocorrer ingestão accidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o acidente.

Armazenagem

Melagrião® Xarope deve ser guardado em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15°C a 30°C].

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

M.S. 1.0066.0055.001-4
Farm. Resp.: T. Fujii - CRF-SC Nº 947
Laboratório Catarinense S.A.
Rua Dr. João Colin, 1053
89204-001 - Joinville - SC
CNPJ 84.684.620/0001-87
Indústria Brasileira
☎ SAC 0800-474222
www.labcat.com.br

® = marca registrada do Laboratório Catarinense S.A.

Cód.: 112347

Rev.: 01/2006



**Laboratório
Catarinense S.A.**