

ph code 42



SORINE

cloridrato de nafazolina
cloreto de benzalcônio
cloreto de sódio

Solução nasal em frasco de 30 ml

USO NASAL**USO ADULTO****Composição completa:**

Cada ml contém:

cloridrato de nafazolina	0,5 mg
cloreto de benzalcônio	0,1 mg
cloreto de sódio	9,0 mg*

Excipiente: Água

* 9 mg de cloreto de sódio + água = solução isotônica de cloreto de sódio qsp 1 ml

INFORMAÇÃO AO PACIENTE:**SORINE** de uso adulto tem ações antisséptica e descongestionante nasal.**SORINE** de uso adulto, quando conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz, apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. **NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.**

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

NÃO INTERROMPER O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.**INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS, TAIS COMO: QUEIMAÇÃO OU ARDÊNCIA.****TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS****SORINE** de uso adulto não deve ser administrado concomitantemente com antidepressivos tricíclicos. **SORINE** de uso adulto é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a quaisquer dos componentes da fórmula.Não deve ser administrado em crianças principalmente menores de 12 anos. **SORINE** de uso adulto deve ser utilizado com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares, hipertireoidismo e diabetes. Não use ininterruptamente por longos períodos.

O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso.

SORINE de uso adulto destina-se ao uso tópico nasal.**INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO, OU DURANTE O TRATAMENTO.****NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ.****NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.****INFORMAÇÃO TÉCNICA:**

O cloridrato de nafazolina é um agonista alfa-adrenérgico utilizado como vasoconstritor e descongestionante nasal, com um rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas).

A administração intranasal da nafazolina leva a um processo de constrição dos vasos dilatados da mucosa nasal, reduzindo o fluxo sanguíneo e o edema tissular.

A associação com o cloreto de benzalcônio confere ao **SORINE** de uso adulto uma excelente ação antisséptica, além de atividades emulsificante, ceratolítica e detergente.

150 mm

100 mm

O cloreto de benzalcônio é um agente antimicrobiano que é rapidamente absorvido pela mucosa e que possui um rápido início de ação e um tempo de ação antimicrobiana moderadamente longo.

Indicações:

Como anti-séptico e descongestionante de uso tópico nasal.

Contra-indicações:

SORINE DE USO ADULTO É CONTRA-INDICADO NO CASO DE HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA A QUALQUER COMPONENTE DA FORMULAÇÃO. SORINE DE USO ADULTO É CONTRA-INDICADO EM CRIANÇAS PRINCIPALMENTE MENORES DE 12 ANOS E DURANTE A GRAVIDEZ. SORINE DE USO ADULTO DESTINA-SE AO USO TÓPICO NASAL, SENDO CONTRA-INDICADO SEU USO EM INALOTERAPIA.

Precauções:

UTILIZAR COM CAUTELA EM PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES E HIPERTIREOIDISMO, *DIABETES MELLITUS*, HIPERTROFIA PROSTÁTICA E PACIENTES QUE APRESENTEM FORTE REAÇÃO A AGENTES SIMPATOMIMÉTICOS, EVIDENCIADA POR SINAIS DE INSÔNIA OU VERTIGEM.

NÃO DEVE SER USADO ININTERRUPTAMENTE DURANTE LONGOS PERÍODOS.

O FRASCO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MAIS DE UMA PESSOA COM A FINALIDADE DE DIMINUIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DO PROCESSO INFECCIOSO.

Interações medicamentosas:

Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase.

O uso concomitante de **SORINE** de uso adulto com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina.

Obs: Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada.

Reações adversas:

PODE OCORRER IRRITAÇÃO LOCAL PASSAGEIRA (QUEIMAÇÃO, ARDÊNCIA, ESPIRROS). JÁ FORAM DESCRITAS OCORRÊNCIAS DE NÁUSEA E CEFALÉIA.

PACIENTES DIABÉTICOS PODEM TER O VALOR DA GLICEMIA ELEVADOS COM O USO CRÔNICO DA NAFAZOLINA.

O USO CRÔNICO DO **SORINE** DE USO ADULTO PODE APRESENTAR CONGESTÃO NASAL POR EFEITO REBOTE E SEU USO PROLONGADO PODE ACARRETAR RINITE MEDICAMENTOSA.

Posologia:

Gotear 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.

Conduta na superdosagem:

Nos casos de superdosagem com **SORINE** de uso adulto, podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaléia, náuseas e vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do sistema nervoso central. Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

Pacientes idosos:

As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens "Precauções" e "Contra-indicações".

MS - 1.0573.0050

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

