

Tecnid

secnidazol



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Comprimidos Revestidos de 1000 mg - caixa com 2 comprimidos.

Pó para suspensão oral de 450 mg - caixa com 1 frasco (15 ml após reconstituição). Agite antes de usar.

Pó para suspensão oral de 900 mg - caixa com 1 frasco (30 ml após reconstituição). Agite antes de usar.

Via Oral

USO ADULTO E/OU PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Comprimido Revestido de 1000 mg - cada comprimido revestido contém:

secnidazol..... 1000 mg
excipientes: dióxido de silício, amido de milho celulose microcristalina, glicolato amido sódico, álcool etílico, polivinilpirrolidona, estearato de magnésio, talco, acetona, álcool isopropílico, polietilenoglicol 6000, dióxido de titânio, copolímero ácido metacrílico E100, água de osmose.

Pó oral (450 mg ou 900 mg) - cada 1 ml de suspensão reconstituída contém:

secnidazol..... 30 mg
excipientes: sacarose, dióxido de silício, aspartame, povidona, aroma de groselha, polivinilpirrolidona.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

TECNID (secnidazol) é um medicamento parasiticida, utilizado no tratamento de giardíase; amebíase intestinal sob todas as formas; amebíase hepática e tricomoníase.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

TECNID (secnidazol) é indicado para:

- giardíase;
- amebíase intestinal sob todas as formas;
- amebíase hepática;
- tricomoníase.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

TECNID (secnidazol) não deve ser utilizado nos seguintes casos:

- alergia aos derivados imidazólicos ou a qualquer componente do produto;
- suspeita de gravidez;
- nos três primeiros meses de gravidez;
- durante a amamentação.

Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

As parasitoses intestinais são amplamente difundidas em crianças e adultos de todas as classes sociais. Para evitá-las deve-se:

- lavar as mãos antes de comer e após defecar;
- comer de preferência alimentos cozidos;
- beber água filtrada ou esfriada após fervura;
- manter as unhas cortadas;
- conservar os alimentos longe de insetos;
- comer de preferência verduras frescas e lavadas em água corrente;
- evitar andar descalço e não pisar nem nadar em águas paradas.

Observando estas recomendações, pode-se evitar que as parasitoses intestinais atinjam a família.

Como acontece com outros imidazólicos, deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento com TECNID (secnidazol) e até 4 dias após o seu término. Verifique sempre o prazo de validade que se encontra na embalagem do produto e confira o nome para não haver enganos. Não utilize TECNID (secnidazol) caso haja

siniais de violação ou danificações da embalagem.

Risco de uso por via de administração não recomendada

Não há estudos dos efeitos de TECNID (secnidazol) administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente pela via oral.

Gravidez e Amamentação

Informe seu médico a ocorrência de gravidez durante ou após o tratamento com TECNID (secnidazol). Informe seu médico se estiver amamentando. TECNID (secnidazol) não deve ser utilizado em caso de suspeita de gravidez, nos três primeiros meses desta e durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou durante a amamentação sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Pacientes idosos

Não há advertências e recomendações especiais sobre o uso adequado desse medicamento em pacientes idosos.

Restrições a grupos de risco

Recomenda-se também evitar a administração de TECNID (secnidazol) aos pacientes com antecedentes de discrasia sanguínea e distúrbios neurológicos.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: TECNID SUSPENSÃO CONTÉM SACAROSE: 581,92 mg/ml

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ingestão concomitante com outras substâncias: Como acontece com outros imidazólicos, deve-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento com TECNID (secnidazol) e por até 4 dias após o seu término.

Associações desaconselháveis:

- dissulfiram: risco de surto delirante, estado confusional;
- álcool: efeito antabuse (calor, vermelhidão, vômito, taquicardia).

Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e de medicamentos contendo álcool durante o tratamento com secnidazol.

Associações que necessitam precaução de uso:

-Anticoagulantes orais (descrito com a varfarina): aumento do efeito anticoagulante e do risco de sangramento por diminuição do metabolismo do fígado.

Recomenda-se controles frequentes da taxa de protrombina e adaptação posológica dos anticoagulantes orais durante o tratamento com secnidazol e até 8 dias após o seu término.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

TECNID (secnidazol) deve ser administrado, por via oral, em uma das refeições, preferencialmente à noite, após o jantar.

ESTE MEDICAMENTO NÃO PODE SER PARTIDO OU MASTIGADO.

Preparação da suspensão

1. Remover a tampa;
2. Adicionar água até a marca indicada no frasco;
3. Colocar a tampa e agitar vigorosamente durante 1 minuto;
4. Administrar em seguida, utilizando o copo medida, conforme prescrição médica.

OBS.: Somente administrar o medicamento com copo medida que acompanha o produto.

Após o término do tratamento com TECNID suspensão (secnidazol), não é recomendável a reutilização do restante do medicamento, uma vez que depois de aberto o frasco, as próprias condições ambientais poderão alterar seus componentes.

POSOLOGIA

INDICAÇÕES	ADULTOS	CRIANÇAS
Tricomoniase	Dose única de 2 comprimidos de 1000 mg (2000 mg); a mesma dose é recomendada para o cônjuge.	
Amebíase intestinal e giardíase	Dose única de 2 comprimidos de 1000 mg (2000 mg).	*Suspensão: Dose única de 30 mg/kg/dia (máximo: 2 g) ou seja 1mL/kg de peso em tomada única (ver instruções abaixo).
Amebíase hepática		* Suspensão: 30 mg/kg/dia (máximo: 2 g), e durante 5 a 7 dias ou seja 1mL/kg de peso durante 5 a 7 dias (ver instruções abaixo).

* OBS.: O medicamento deve ser administrado em uma das refeições, preferencialmente a noite.

Conduta necessária caso haja esquecimento de administração

Caso esqueça de tomar uma dose, tome-a assim que possível, no entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca tome duas doses ao mesmo tempo.

SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

ASPECTO FÍSICO DO MEDICAMENTO

TECNID (secnidazol) comprimidos de 1000 mg

Comprimido revestido elípticos de coloração branca levemente amarelada.

TECNID (secnidazol) suspensão

Granulado fino, ligeiramente amarelado.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Ver item ASPECTO FÍSICO.

QUAIS AS REAÇÕES ADVERSAS QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Pode ocorrer raramente reações desagradáveis como:

- distúrbios digestivos: náuseas, gastralgia, alteração do paladar (gosto metálico), glossites e estomatites;
- erupções na pele;
- leucopenia moderada, reversível com a suspensão do tratamento;
- mais raramente: fenômenos neurológicos como vertigens (tontura), fenômenos de incoordenação (ataxia), parestesias, polineurites sensitivo-motoras.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Neste caso, realizar lavagem gástrica o mais precocemente possível e instituir tratamento sintomático de acordo com o necessário.

Em caso de superdose acidental, procure imediatamente atendimento médico de emergência.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

TECNID (secnidazol) comprimidos deve ser guardado dentro de sua embalagem original em temperatura ambiente (entre 15° e 30°). TECNID (secnidazol) suspensão deve ser guardada dentro da embalagem original em temperatura ambiente (entre 15° e 30°), ao abrigo da luz e umidade. Após a reconstituição, o produto mantém-se estável durante 10 dias à temperatura ambiente e 14 dias sob refrigeração (entre 2° e 8°C).

Após o término do tratamento com TECNID suspensão (secnidazol), não é recomendável a reutilização do restante do medicamento, uma vez que depois de aberto o frasco, as próprias condições ambientais poderão alterar seus componentes.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula é continuamente atualizada. Favor proceder a sua leitura antes de utilizar o medicamento.

DIZERES LEGAIS

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO

M.S. 1.1861.0037 • Farm. Resp.: Dra. Amanda Públio da Silva • CRF-SP nº 37152

Ativus Farmacêutica Ltda.

Rua Fonte Mécia, 2.050 • Caixa Postal 489 • CEP 13273.900 • Valinhos/SP

SAC • 0800 771 2010 • <http://www.ativus.com.br> • CNPJ nº 64.088.172/0001-41 • Indústria Brasileira

Cód. 13.003 • Rev.9.10 (C)