

THERAPSOR CREME E LOÇÃO CAPILAR (*Theraskin*).

Propionato de clobetasol 0,05%

Creme, unguento e solução capilar

Composição

Cada grama/ml de THERAPSOR[®] Creme, Unguento e Solução capilar contém: Propionato de clobetasol 0,5 mg. *Informações técnicas:* O mecanismo de ação antiinflamatória dos corticosteróides não está totalmente elucidado. Acredita-se que aumente a síntese das proteínas lipocortinas, inibidoras da fosfolipase A2, responsáveis pela liberação do ácido araquidônico das membranas celulares. Esse ácido é precursor de potentes mediadores da inflamação, como os leucotrienos e as prostaglandinas.

Indicações

THERAPSOR[®] é indicado para a melhora dos sintomas da inflamação e/ou prurido associados às doenças agudas ou crônicas não-responsivas aos corticosteróides de potências mais baixas, como: dermatoses alérgicas, eczemas, dermatoses granulomatosas não-infecciosas, dermatites inflamatórias, líquen escleroso e atrófico, lúpus eritematoso, picadas de insetos e pruridos em geral.

Contra-indicações

THERAPSOR[®] é contra-indicado em pacientes com rosácea e dermatite perioral e com hipersensibilidade ao propionato de clobetasol ou a qualquer componente da fórmula. *Precauções:* O uso de corticosteróides tópicos em grandes quantidades, por períodos longos e/ou áreas extensas da pele oferece o risco de efeitos colaterais locais e sistêmicos, especialmente em crianças, normalmente revertidos após a suspensão do tratamento. *Gravidez/amamentação:* Não é aconselhável o emprego de corticosteróides tópicos em grandes quantidades ou em longo prazo durante a gravidez. FDA categoria C. Não foi determinado se o uso tópico de corticosteróides resulta em absorção sistêmica suficiente para produzir quantidades detectáveis no leite materno. THERAPSOR[®] não deve ser utilizado nos mamilos antes da amamentação. *Pediatria:* THERAPSOR[®] não deve ser utilizado em crianças menores que 12 anos, exceto em circunstâncias especiais. O ideal é utilizar a menor dose compatível com a resposta terapêutica e tratamentos curtos. *Geriatría:* Pacientes idosos são mais propensos a desenvolver púrpuras e lacerações cutâneas ou subcutâneas. A terapia tópica nesses pacientes deve ser curta.

Reações adversas

No esquema terapêutico recomendado, THERAPSOR[®] é bem tolerado. Quando utilizado por períodos longos, áreas extensas e curativos oclusivos, pode ocasionar reações locais e sistêmicas. As reações mais comuns são sintomas irritativos locais (hiperemia e sensação de queimação) que desaparecem com a suspensão do tratamento.

Posologia

O tratamento com THERAPSOR[®] deverá ser sob indicação e supervisão médica. Exceto em indicações especiais, THERAPSOR[®] não é recomendado para uso em crianças menores de 12 anos de idade. Uso local 1-2 vezes ao dia ou a critério médico. Aplicar uma pequena quantidade de THERAPSOR[®] na área a ser tratada e espalhar bem. *Dose máxima no adulto:* Não ultrapassar 50 g ou 50 ml de THERAPSOR[®]/semana.

Apresentações

Creme e unguento: Embalagem contendo bisnaga com 25 g. *Solução capilar:* Frasco com 25 ml.