

Vitergan[®] Master

Panax ginseng C.A. Mey + Associações

**Mineral
Polivitamínico**

Uso adulto

Forma farmacêutica e apresentação - Cápsula gelatinosa mole: Cartucho com 30 cápsulas.

Composição - Cada cápsula de VITERGAN MASTER contém: Extrato estandardizado de *Panax ginseng* C.A. Mey 40 mg; Palmitato de retinol (vitamina A) 4.000 UI (400%*); Nitrato de tiamina (vitamina B₁) 2 mg (333%*); Riboflavina (vitamina B₂) 2 mg (308%*); Cloridrato de piridoxina (vitamina B₆) 1 mg (154%*); Cianocobalamina (vitamina B₁₂) 1 mcg (83%*); Ácido ascórbico (vitamina C) 60 mg (267%*); Colecalciferol (vitamina D) 400 UI (400%*); Acetato de tocoferol (vitamina E) 10 mg (298%*); Nicotinamida 15 mg (187%*); Pantotenato de cálcio 10 mg (400%*); Ácido fólico 0,4 mg (333%*); Rutosídeos 20 mg; Fumarato ferroso (equivalente a 10 mg de ferro) 30,34 mg (143%*); Fosfato de cálcio dibásico (equivalente a 103,5 mg de cálcio e 80 mg de fósforo) 351,35 mg (21%* e 23%*); Sulfato de cobre (equivalente a 1 mg de cobre elementar) 3,93 mg (222%*); Gliconato de potássio (equivalente a 4 mg de potássio) 24 mg; Sulfato de manganês (equivalente a 1 mg de manganês) 3,07 mg (87%*); Gliconato de magnésio (equivalente a 5 mg de magnésio) 85,31 mg (4%*); Óxido de zinco (equivalente a 1 mg de zinco) 1,254 mg (29%*); Lecitina de soja 92,0 mg. Excipiente q.s.p. 1 cápsula. (* Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à ingestão mínima diária recomendada.)

Indicações - VITERGAN MASTER é indicado nos estados de esgotamento, fadiga, sensação de fraqueza e diminuição da concentração. Também nos casos de nutrição mal balanceada ou deficiente, na convalescença prolongada, na melhora da resistência em geral; na prevenção e no tratamento dos sinais e sintomas da deficiência de vitaminas e minerais, causados pelo avanço da idade.

Contraindicações - VITERGAN MASTER é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; na presença de distúrbios do metabolismo do cálcio, hipercalcemia e hipercalcúria, respectivamente; em caso de hipervitaminoses A e D; na presença de insuficiência renal; durante tratamentos com retinoides, como, por exemplo, contra a acne. Este produto contém o corante amarelo de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Posologia - Recomendam-se, nas duas ou três semanas iniciais, duas cápsulas ao dia, uma no café da manhã e outra no almoço, passando-se, a seguir, para uma cápsula ao dia, no café da manhã. A duração do tratamento fica a critério do médico.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Registro no M.S. 1.0155.0205.

MARJAN Indústria e Comércio Ltda.