

zincolok®

sulfato de zinco 0,25%

cloridrato de nafazolina 0,05%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Frasco plástico conta-gotas contendo 10 ml de solução oftálmica estéril.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 2,5 mg de sulfato de zinco e 0,5 mg de cloridrato de nafazolina.

Veículo: cloreto de sódio, citrato de sódio diidratado, cloreto de benzalcônio, clorobutanol, glicerina e água purificada q.s.p.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: ação antisséptica, adstringente e vasoconstritora.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: instile a dose recomendada, no saco conjuntival, evitando tocar a ponta do frasco nos tecidos oculares. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

Zincolok® (sulfato de zinco, cloridrato de nafazolina) solução oftálmica, devido ao seu componente sulfato de zinco, tem ação antisséptica e adstringente de efeito comprovado nas conjuntivites crônicas e nas hiperemias conjuntivais.

O sulfato de zinco apresenta, além disso, indicação específica na conjuntivite angular provocada pelo diplobacilo de Morax Axenfeld (*Moraxella lacunata*).

O cloridrato de nafazolina, pela sua propriedade vasoconstritora, traz um efeito imediato no alívio de hiperemia e congestão vascular conjuntival.

Indicações

Zincolok® (sulfato de zinco, cloridrato de nafazolina) solução oftálmica é indicado no tratamento das conjuntivites crônicas e das hiperemias conjuntivais. Também é indicado no tratamento auxiliar das conjuntivites crônicas e conjuntivites causadas pelo diplobacilo de Morax Axenfeld.

Contra-Indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, glaucoma de ângulo estreito ou predisposição ao mesmo.

Precauções e advertências

Não são necessárias precauções especiais para o uso deste produto.

Interações Medicamentosas

O produto deverá ser usado com cautela em pacientes sob tratamento com inibidores de MAO, uma vez que uma eventual absorção sistêmica significativa poderá provocar uma crise hipertensiva.

Reações Adversas

Em doses elevadas e tempo prolongado: hiperemia ocular, visão turva, pupilas dilatadas, cefaléia, nervosismo, náuseas e aumento da sudorese.

Posologia

Instile 1 a 2 gotas nos olhos, 3 a 4 vezes ao dia.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Para excesso de produto instilado no olho, lave com água ou soro fisiológico. Se, acidentalmente, for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

Pacientes Idosos


Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. ANVISA/ MS - 1.0147.0026

Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer
CRF-SP nº 18.150



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos - SP
CNPJ 43.426.626/0009-24
Indústria Brasileira
® Marca Registrada
Texto adaptado à portaria 110/97

72165BR10X - Laetus: 186

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-144077
Discagem Direta Gratuita