

SUPRADYN

Multivitamínico + minerais

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO - SUPRADYN

Nomes genéricos

Palmitato de retinol (vitamina A), Mononitrato de tiamina (vitamina B1), Riboflavina e Riboflavina
5- fosfato-sódico (vitamina B2), Nicotinamida (vitamina PP), Cloridrato de piridoxina (vitamina B6), Pantotenato de Cálcio (vitamina B5), Biotina (vitamina H), Cianocobalamina (vitamina B12), Ácido ascórbico (vitamina C), Colecalciferol (vitamina D), Acetato de tocoferol (vitamina E), Fosfato de cálcio tribásico e Glicerofosfato de cálcio (cálcio e fósforo), Óxido de magnésio e Glicerofosfato de magnésio (magnésio e fósforo), Carbonato ferroso e Sulfato ferroso (ferro), Sulfato de manganês (manganês), Sulfato cúprico (cobre), Sulfato de zinco (zinco), Molibdato de sódio (molibdênio) e Borato de sódio (Boro).

Formas farmacêuticas e apresentações - SUPRADYN

Drágeas: caixas com 30 drágeas

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição - SUPRADYN

Vitamina A	10.000 UI
Vitamina B1	20,0 mg
Vitamina B2	5,0 mg
Vitamina B5	11,6 mg
Vitamina B6	10,0 mg
Vitamina B12	5,0 mg
Vitamina PP	50,0 mg
Vitamina H	0,25 mg
Vitamina C	150,0 mg
Vitamina D	500,0 UI
Vitamina E	10,0 mg
Cálcio	129,0 mg
Ferro	50,0 mg
Fósforo	25,8 mg
Magnésio	60,0 mg

Manganês	2,05 mg
Cobre	3,9 mg
Zinco	2,3 mg
Molibdênio	0,25 mg
Boro	0,88 mg

Atenção: Cada drágea contém 350 mg de glicídios correspondente a 1,4 calorias.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE - SUPRADYN

Supradyn® é um medicamento que possui vitaminas e sais minerais e está particularmente indicado para os casos de deficiência dos mesmos.

Supradyn® deve ser tomado com um pouco de líquido ou de acordo com orientação médica.

Este medicamento não deve ser utilizado por pessoas que apresentam hipervitaminose A ou D (isto é, excesso de vitamina A e D no organismo) e por aquelas que sofrem de insuficiência renal. O Supradyn® também não deve ser tomado por períodos muito longos ou doses acima das recomendadas pelo médico.

O Supradyn® não deve ser utilizado por mulheres grávidas, a não ser que haja uma indicação específica e sempre sob controle médico.

Por outro lado, os parkinsonianos em tratamento com levodopa pura não devem fazer uso deste medicamento, pois a vitamina B6 presente no Supradyn® interfere com o tratamento específico.

O Supradyn® em geral é bem tolerado, porém podem ocorrer, eventualmente, reações alérgicas ou intolerância gastrointestinal, com náusea, vômitos e diarreia, ou ainda outros efeitos indesejáveis não previstos e dependentes da tolerância individual ao medicamento. Caso ocorram reações com uso do Supradyn® suspenda o uso do medicamento e informe imediatamente ao seu médico.

O Supradyn® tem prazo de validade a partir da data de fabricação, impressa na parte externa da embalagem. Não é recomendável o uso de qualquer remédio com prazo de validade vencido.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - SUPRADYN

Propriedades e efeitos - SUPRADYN

O Supradyn® contém em sua fórmula as principais vitaminas, além de minerais e oligoelementos essenciais necessários ao organismo em casos de doenças agudas ou crônicas, assim como

nos

estados em que há necessidades de proteção específica tais como: convalescença, gravidez, aleitamento, déficit alimentar de pessoas idosas, antibioticoterapia.

Restrições de uso - SUPRADYN

O Supradyn® está contra- indicado na hipervitaminose A e D e nos casos de insuficiência renal. Não deve ser administrado por período prolongado em doses superiores às recomendadas. O Supradyn® não está indicado no tratamento de hipovitaminoses específicas graves.

Em experimentação animal, doses muito elevadas de vitamina A demonstraram ser teratogênica e foram associadas a casos isolados de malformação no homem. Como o Supradyn® contém vitamina A em dose elevada, sua administração deve ser evitada no início da gravidez, a não ser que seja necessário corrigir o déficit desta vitamina.

Como ocorre com outros medicamentos, seu uso em pacientes renais crônicos deve ser avaliado.

Devido à baixa dosagem de vitamina B12, o Supradyn® não está indicado para o tratamento de anemia perniciosa ou outras anemias megaloblásticas.

Interações medicamentosas - SUPRADYN

O Supradyn® contém vitamina B6 e seu uso deve ser evitado em pacientes parkinsonianos em tratamento com levodopa pura. A associação de levodopa com benserazida ou carbidopa não sofre interferência desta vitamina.

Deve-se evitar o uso concomitante de derivados do ácido retinóico (etretinato, isotretinoína) com produtos que contenham vitamina A devido a possibilidade do aparecimento da hipervitaminose A.

Reações adversas - SUPRADYN

Reações alérgicas e idiossincrásicas não são impossíveis de ocorrer quando do uso de vitaminas.

O ferro, mesmo em doses terapêuticas, tem sido associado com intolerância gastrointestinal em alguns pacientes.

Posologia - SUPRADYN

1 drágea ao dia ou a critério do médico.

Conduta na superdosagem - SUPRADYN

Devido a presença da vitamina A em sua fórmula, uma superdosagem por período prolongado poderá ocasionar sintomas relacionados a superdosagem dessa vitamina. O tratamento consiste em suspensão do medicamento e controle contínuo das funções cardíacas, hepática e renal, hemograma e fundo de olho.

SUPRADYN - Laboratório

BAYER
Rua Domingos Jorge, 1100
São Paulo/SP - CEP: 04779-900
Tel: 08007231010
Fax: 55 (011)548-0485
Site: <http://www.bayer.com.br/>

Ver outros medicamentos do laboratório "BAYER"