



 prati-donaduzzi

acetato de dexametasona

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O MEDICAMENTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Creme dermatológico de 1 mg/g em embalagem com 1 ou 100 bisnagas de 10 g.

USO TÓPICO - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

FÓRMULA

Cada g de acetato de dexametasona creme dermatológico contém:

acetato de dexametasona.....1 mg

excipiente q.s.p.....1 g

Excipientes: álcool cetílico, monoestearato de glicerila, cetomacrogol 1.000, petrolato líquido, petrolato branco, metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, butil-hidroxitolueno, água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O acetato de dexametasona creme dermatológico age aliviando a coceira e os sintomas da inflamação.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

O acetato de dexametasona creme dermatológico é indicado para o alívio de coceiras, como anti-inflamatório tópico no tratamento de doenças da pele, como dermatites de contato, dermatite atópica, neurodermatites, prurido (coceira) com liquenificação, dermatites com eczemas (ardência), eczema alimentar, eczema infantil, dermatite actínica, dermatite seborreica, miliária, impetigo, queimaduras solares, picadas de insetos e inflamação do ouvido externo.

O acetato de dexametasona creme dermatológico auxilia no tratamento, mas não substitui a terapia convencional.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O acetato de dexametasona creme dermatológico não deve ser usado em pacientes alérgicos ao acetato de dexametasona creme ou a qualquer outro componente da fórmula.

Este medicamento não pode ser aplicado sobre a pele na presença de tuberculose da pele, varicelas, infecções causadas por fungos ou herpes simples.

O acetato de dexametasona creme dermatológico não deve ser aplicado no ouvido se a membrana do tímpano estiver perfurada.

O acetato de dexametasona creme dermatológico deve ser usado somente sob orientação médica.

Se ocorrerem infecções durante o uso do acetato de dexametasona creme dermatológico, suspender a aplicação do mesmo até que o estado da infecção seja controlado adequadamente.

Não existem interações conhecidas relacionadas ao uso do acetato de dexametasona creme dermatológico com outros medicamentos ou alimentos.

Não há contraindicações relativas a faixas etárias.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao seu médico se estiver amamentando.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Creme de uso tópico, homogêneo, de cor branca.

Antes de aplicar acetato de dexametasona creme dermatológico deve-se limpar cuidadosamente o local afetado. Aplicar sobre a área afetada uma pequena quantidade suavemente, evitando fricção exagerada.

Usar 2 a 3 vezes ao dia, ou conforme orientação médica.

Ao aplicar no ouvido, limpar e secar o conduto auditivo externo antes. Com auxílio de um cotonete, espalhe o acetato de dexametasona creme dermatológico sobre as paredes do conduto auditivo externo, 2 a 3 vezes ao dia.

Siga a orientação de seu médico respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

O acetato de dexametasona creme dermatológico pode causar: sensação de ardência, coceira, irritações, securas, inflamação de pelos, crescimento excessivo de pelos normais, aparecimento de espinhas, alergia ao medicamento, estrias e alergias localizadas nas dobras da pele.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

O acetato de dexametasona creme dermatológico não causa toxicidade quando usado em quantidade adequada sobre a pele. Caso aconteça ingestão acidental, procurar imediatamente um médico.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser guardado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz. Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

O acetato de dexametasona creme dermatológico possui um efeito potente como anti-inflamatório e antipruriginoso, sendo um glicocorticoide sintético útil no tratamento de várias formas de dermatoses.

INDICAÇÕES

Acetato de dexametasona creme dermatológico é indicado como anti-inflamatório e antipruriginoso no tratamento de várias formas de dermatoses.

É indicado para auxiliar no tratamento de dermatoses alérgicas como dermatites de contato, dermatite atópica, neurodermatites, dermatite eczematóide, dermatite actínica, dermatite seborreica, pruridos com liquenificações, prurido anogenital, eczema alimentar, eczema infantil, miliária, impetigo, queimadura devido à exposição aos raios solares, picadas de insetos e otite externa (quando não houver perfuração da membrana do tímpano).

Este medicamento não substitui a terapia convencional.

CONTRAINDICAÇÕES

O acetato de dexametasona creme dermatológico não deve ser aplicado sobre a pele na presença de tuberculose da pele, varicelas, e infecções causadas por fungos e herpes simples. Este medicamento não deve ser utilizado em pacientes que possuem hipersensibilidade ao acetato de dexametasona creme dermatológico ou a qualquer outro componente da fórmula. Não aplicar o acetato de dexametasona creme dermatológico no ouvido, caso a membrana do tímpano estiver perfurada.

MODO DE USAR E CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

Antes de aplicar o acetato de dexametasona creme dermatológico, deve-se fazer a assepsia do local afetado, sua aplicação deve ser suave evitando fricção demasiada sobre a área afetada.

O acetato de dexametasona creme dermatológico deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz.

POSOLOGIA

Após limpar o local afetado, aplicar uma pequena quantidade de acetato de dexametasona creme dermatológico 2 a 3 vezes ao dia ou conforme orientação médica. Caso a aplicação seja no ouvido deve-se limpar e secar o conduto auditivo externo, com auxílio de um cotonete, espalhar o creme delicadamente nas paredes do conduto auditivo externo, 2 a 3 vezes ao dia.

ADVERTÊNCIAS

Medicamentos que contenham corticoides como o acetato de dexametasona creme dermatológico, devem ser usados somente sob orientação médica.

Se durante o uso do acetato de dexametasona creme dermatológico, surgirem infecções, o uso deste medicamento deve ser interrompido. Medidas adequadas são necessárias para que o estado infeccioso seja controlado.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informar ao seu médico se estiver amamentando.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

Não existem restrições ou recomendações especiais quanto ao uso do acetato de dexametasona creme dermatológico em pacientes idosos, crianças e outros grupos de risco.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há conhecimento de interações medicamentosas prejudiciais com o uso de acetato de dexametasona creme dermatológico.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

As seguintes reações adversas foram observadas com uso do acetato de dexametasona creme dermatológico: sensação de ardor, irritação, coceira, securas, foliculite, hipertricrose, hipopigmentação, erupções acneiformes, dermatite alérgica de contato, estrias, miliária e maceração da pele.

SUPERDOSE

O acetato de dexametasona creme dermatológico não causa toxicidade se usado em quantidade adequada sobre a pele. Caso aconteça ingestão acidental, procurar imediatamente um médico.

ARMAZENAGEM

O acetato de dexametasona creme dermatológico deve ser armazenado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz. Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. no M.S. 1.2568.0126

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi CRF-PR 5842

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro Industrial Nilton Arruda, Toledo-PR

CNPJ 73.856.593/0001-66

INDÚSTRIA BRASILEIRA



**Centro de Atendimento
ao Consumidor**

0800 709 9333 / 45 2103-1166

www.pratidonaduzzi.com.br

cac@pratidonaduzzi.com.br

1799 400940 AB - 13025 407490 Dob40 - 4157 402528 Dob80 - 13024 407489 Dob80cz - 13633 407961 - R3
200x160 - 16/04/15