

meses contados a partir da data de fabricação. Não use medicamentos com o prazo de validade vencido.

#### **GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:**

Este medicamento somente pode ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

#### **CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO:**

Não tomar **CARVEROL** junto com outros medicamentos, pois existe o risco do carvão absorver o medicamento, e este perder sua ação.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

#### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Constipação intestinal (intestino preso).

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

#### **INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS:**

Potencialmente **CARVEROL** absorve a maioria das substâncias químicas, então não se deve tomá-lo, com qualquer tipo de medicamento.

#### **CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:**

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Não usar o produto no caso de intoxicação aguda.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco:

Como **CARVEROL** não é absorvido, não existe restrições para nenhum destes grupos de paciente.

Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes.

Este medicamento somente pode ser utilizado durante a gravidez sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

#### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

##### **CARACTERÍSTICAS:**

As substâncias adsorventes, como o carvão ativado, tem a propriedade de unir substâncias à sua superfície, o que lhes permite fixar toxinas bacterianas, químicas irritantes e gases; atuam também como protetor das mucosas. O carvão ativado é obtido por aquecimento de substâncias orgânicas de origem vegetal (em geral, madeira), submetidas rapidamente a um processo, a alta temperatura com o vapor de água, para

aumentar seu poder adsorvente por aumento de sua superfície.

**CARVEROL** não é absorvido pelo trato gastrointestinal. Pode-se ingeri-lo, até as três horas posteriores à ingestão da substância tóxica.

#### **INDICAÇÕES:**

**CARVEROL** pode ser utilizado em todos os casos que se necessite da absorção de gases e toxinas, bem como auxiliar no tratamento de enterites, colites e enterocolites, aerofagias e meteorismos.

#### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

**O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

**Não usar o produto no caso de intoxicação aguda.**

#### **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

**Gerais:** não tomar **CARVEROL** junto com outros medicamentos, pois existe o risco do carvão absorver o medicamento, e este perder sua ação.

**Pediatria:** não é recomendado o uso do medicamento a crianças abaixo de 2 anos.

**Gravidez:** este medicamento somente pode ser utilizado por mulheres grávidas desde que sob prescrição médica ou do cirurgião dentista.

**Amamentação:** o produto não apresenta nenhum risco durante a amamentação.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

Potencialmente **CARVEROL** absorve a maioria

das substâncias químicas, então não se deve tomá-lo, com qualquer tipo de medicamento.

#### **INTERFERÊNCIA EM EXAMES LABORATORIAIS:**

**CARVEROL** não apresenta interferência em exames laboratoriais.

#### **REAÇÕES ADVERSAS/COLATERAIS: Constipação intestinal.**

#### **POSOLOGIA:**

Adultos: 4 a 6 comprimidos por dia, em duas doses divididas, nos intervalos das refeições.  
Crianças: metade da dose indicada para adultos, com um pouco de água.

#### **SUPERDOSAGEM:**

Não há relatos de superdose com o uso de **CARVEROL**, mesmo porque, o carvão medicinal não é absorvido.

#### **PACIENTES IDOSOS:**

Não há restrições específicas para o uso em pacientes idosos.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.  
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Número do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

Registro MS – 1.3346.0002  
Farm Resp.: Vera Lúcia Carvalho Mazzola  
CRF-SP nº 8589

Propriedade:  
BIO MACRO Laboratório Farmacêutico Ltda  
CNPJ 57.934.713/0001-40 - Indústria Brasileira



**UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 – Embu-Guaçu – SP  
CEP 06900-000 / SAC 0800 11 1559  
CNPJ 60.665.981/0001-18 – Indústria Brasileira  
Farm. Resp.: Ishii Massayuki - CRF-SP nº 4863

EE 895018 B

Faca: 225 x 150 mm

## **CARVEROL**

carvão vegetal ativado

Comprimido



#### **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:**  
Comprimido: caixa com 20 comprimidos.

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO** (crianças maiores de 2 anos)

#### **COMPOSIÇÃO: Comprimido**

Cada comprimido contém:  
carvão vegetal ativado ..... 250 mg  
Excipientes: glicose de milho, sacarose, celulose microcristalina, lactose, amido de milho, talco grau farmacêutico, metilparabeno, propilparabeno, glicolato de amido monossódico, estearato de magnésio.

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

##### **AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:**

O carvão vegetal medicinal ativado age como desinfetante e desodorizante, absorvendo gases (flatulência) e toxinas bacterianas que provêm de processos alimentares, aerofagias (gases formados no estômago).

##### **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:**

**CARVEROL** deve ser conservado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15 a 30°C) e protegido da umidade.

##### **PRAZO DE VALIDADE:**

**CARVEROL** possui um prazo de validade de 36