

DIMENSÕES: 110 x 160 mm  
COR: PRETO  
CÓDIGO PHARMACODE: 2195 (FFGFFGFFGFF)  
PROGRAMA: PAGE MAKER 6,5  
FONTES: AGFA ROTIS SANS SERIF

QUADRO COM O NOME DO PRODUTO: PRETO 15%  
SENTIDO DA FIBRA: PERPENDICULAR AO TEXTO

Motivo da alteração: Lançamento.



APROVAÇÃO  
DE  
EMBALAGEM

Código anterior: NA

10024540 - BULA CEBION (2195) GOTAS  
110 x 160 mm - FRENTE



Cebion® Gotas



ácido ascórbico

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES  
CEBION® Gotas Solução 200 mg/ml - Embalagens contendo 30 ml.

USO ORAL - ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO  
CEBION® Gotas - Solução 200 mg/ml

Cada ml da solução contém:  
ácido ascórbico (vitamina C) ..... 200 mg  
Excipientes: sorbitol, sacarose, metilparabeno, propilparabeno, aroma de caramelo, álcool etílico, hidróxido de sódio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento

Correção dos estados de carência de vitamina C, estímulo das defesas orgânicas nas épocas de maior perigo de infecção, suprimento das necessidades que ocorrem em estados normais (gestação, lactação, atividade desportiva, trabalho intenso) e patológicos (doenças infecciosas e estados febris).

Cuidados de armazenamento

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz. Após a utilização do medicamento, manter o frasco bem fechado.

Prazo de validade

CEBION® Gotas é válido por 24 meses a partir da data de fabricação. Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido, pois há perda de ação terapêutica.

Gravidez e lactação

CEBION® pode ser usado na gravidez e durante a amamentação, quando houver necessidade de um maior suprimento de vitamina C.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Reações adversas

As reações adversas são pouco frequentes e de pequena intensidade. As mais comuns são diarreia, pirose, aumento da diurese, náuseas e vômitos. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

- TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingestão concomitante com outras substâncias

A ingestão juntamente com alimentos não prejudica a absorção de CEBION®.

Contraindicações e Precauções

A vitamina C é contraindicada nos casos de litíase urinária oxálica e úrica; insuficiência renal; hipersensibilidade a qualquer um dos excipientes. O paciente deverá comunicar ao médico o uso de CEBION® caso lhe seja recomendado fazer exames laboratoriais, pois a vitamina C pode interferir com os resultados de vários exames.

- NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

- ATENÇÃO DIABÉTICOS: CEBION® GOTAS CONTÊM AÇÚCAR.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

A vitamina C é indispensável para o perfeito funcionamento de todas as células. Desempenha importante papel no metabolismo celular, participando dos processos de oxido-redução. Através de sua atuação no transporte de elétrons, intervém em diversas reações metabólicas, tais como: hidroxilação da prolina durante a formação do tecido conjuntivo; oxidação das cadeias laterais de lisina em proteínas para fornecer hidroxitrimetil-lisina para a síntese de carnitina; síntese de noradrenalina e de hormônios corticóides pelas suprarrenais; conversão do ácido fólico em sua forma ativa de ácido fólico; metabolização microsossomal de drogas; metabolismo da tirosina.

A vitamina C também desempenha importante papel na proteção do organismo contra infecções, aumentando a função bactericida no sangue, participando ainda na formação de anticorpos. Possui também a propriedade de neutralizar a ação tóxica de produtos metabólicos e de várias toxinas bacterianas.

A vitamina C tem influências múltiplas sobre o sangue, os órgãos hematopoéticos e os vasos sanguíneos. Favorece a adesão das células endoteliais dos capilares, a ativação da trombina e estimula a atividade da medula óssea (produção de trombócitos, leucócitos e eritrócitos; absorção e aproveitamento do ferro; ativação do ácido fólico). O mau abastecimento orgânico de vitamina C pode ocorrer não só em consequência de alimentação deficiente, mas também devido a distúrbios de absorção, doenças infecciosas e ao estresse.

A carência de vitamina C manifesta-se por cansaço, resistência diminuída a infecções, sangramentos mucosos e cutâneos, retardo no tempo de cicatrização de feridas, gengivite, perda de dentes, anemia e alterações cutâneas (hiperceratose, obstrução de folículos pilosos, etc).

Indicações

Suplemento vitamínico como auxiliar do sistema imunológico.



10024540 - BULA CEBION (2195) GOTAS  
110 x 160 mm - VERSO



**Contraindicações**

A vitamina C é contraindicada nos casos de litíase urinária oxálica e úrica; insuficiência renal; hipersensibilidade a qualquer um dos excipientes.

**Precauções e Advertências**

Pacientes diabéticos, hipoglicêmicos, hipertensos e cardíacos devem procurar orientação médica antes de tomar CEBION®, por causa de seu conteúdo de hidratos de carbono e sódio.

Em pacientes submetidos a dietas hipoglicídicas é necessário considerar que cada ml CEBION® Gotas contém 0,5 g de sacarose.

**Interações medicamentosas**

O uso simultâneo com barbitúricos aumenta a necessidade diária do ácido ascórbico; com desferroxamina, pode potencializar os efeitos tóxicos pelo ferro nos tecidos; com salicilatos, pode aumentar a excreção urinária do ácido ascórbico.

**Reações adversas**

As reações adversas, pouco frequentes e de pequena intensidade, compreendem queixas de perturbações digestivas, principalmente diarreia, pirose, aumento da diurese, náuseas e vômitos. O uso de doses elevadas de vitamina C, por tempo prolongado, pode ocasionar o escorbuto de rebote.

Em pacientes predispostos, o uso de doses de vitamina C superiores a 1 g/dia pode desencadear o aparecimento de litíase oxálica ou úrica.

CEBION® não deve ser tomado por pessoas com cálculos renais ou com insuficiência renal ou alergia a qualquer um dos excipientes.

CEBION® é um produto bem tolerado. Em algumas pessoas podem ocorrer transtornos gastrointestinais (azia, diarreia, enjoo e vômitos) de pequena intensidade.

Em pessoas predispostas, o uso de altas doses de vitamina C pode ocasionar cálculos urinários de oxalato ou urato. A vitamina C pode interferir com os resultados de alguns exames laboratoriais para determinação de glicemia, glicosúria e níveis séricos de transaminases, desidrogenase láctica e bilirrubina.

Pode também condicionar resultados falsamente negativos em pesquisas de sangue oculto nas fezes.

É necessário interromper o uso de vitamina C antes desses exames.

**Posologia**

1 ml corresponde a aproximadamente 24 gotas.

Cada gota contém aproximadamente 9 mg de vitamina C.

Lactentes - até 300 mg (36 gotas ao dia).

Crianças maiores - até 1000 mg (120 gotas) ao dia.

Adultos - 1000 mg (120 gotas) ao dia.

Doses superiores às recomendadas só devem ser tomadas por indicação médica.

**Superdose**

Não existem relatos de intoxicação por superdose da vitamina C. Em caso de reações adversas, suspender o uso do produto e, se necessário, utilizar medicação sintomática.

**Pacientes idosos e crianças**

Não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

- SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

- VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

- Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa.

M.S. 1.0089.0071  
Farm. Resp.: Geraldo César Monteiro de Castro  
CRF-RJ nº 14021  
MERCK S.A.  
CNPJ 33.069.212/0001-84  
Estrada dos Bandeirantes, 1099  
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22710-571  
Indústria Brasileira  
Com autorização de:  
Merck KGaA, Darmstadt - Alemanha



10024540

**Cebion® Gotas**  
ácido ascórbico

PHARMACODE 2195

