




TRAVEL DIRECTION



Veículos: ácido cítrico anidro, ácido láctico, aroma cítrico composto, butildroxianisol, butildroxitolueno, cisteína, corante caramelo, açúcar líquido, dextrose anidra, glicerol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, goma xantana, óleo de mamona, óleo de milho, manitol e água.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE
Como este medicamento funciona?

Clusivol® Composto é um suplemento de vitaminas, minerais e lisina, por esta razão, todos e cada um dos elementos de sua fórmula não tem por finalidade efeitos terapêuticos. Quando tomado regularmente, cada um dos ingredientes de sua fórmula tem por objetivo suprir as prováveis deficiências de nutrientes que a dieta ou outras condições biológicas podem originar.

Clusivol® Composto, além de reunir todos esses elementos essenciais, possui sabor agradável, o que facilita sua administração às crianças.

Por que este medicamento foi indicado?

Clusivol® Composto está indicado como suplemento de vitaminas, minerais e lisina nos seguintes casos:

- para lactentes e crianças em fase de crescimento;
- em dietas restritivas e inadequadas;
- na prevenção do raquitismo;
- na prevenção da cegueira noturna e xerofthalmia;
- como auxiliar do sistema imunológico;
- em doenças crônicas ou convalescença e
- no pós-cirúrgico.

Quando não devo usar este medicamento?

Clusivol® Composto não deve ser utilizado por pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula. ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTEM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES. ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE POSSAM FICAR GRÁVIDAS DURANTE O TRATAMENTO. NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS. INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

Como devo usar este medicamento?

Aspectos físicos e características organolépticas: líquido viscoso e opaco, marrom escuro, com odor e sabor de laranja. Agite antes de usar.

Clusivol® Composto deve ser administrado diariamente, nas doses recomendadas, conforme tabela abaixo, em uma única tomada ou dividida em duas, preferencialmente junto às refeições. Pode ser diluído em água, chá, suco de frutas ou misturado a alimentos.

Idade (anos)	Dose diária (mL)
Lactentes	Sob orientação médica
1 a 3	2,5 a 5
4 a 6	5
7 a 11	10
Acima de 12 anos e adultos	20

Pode ser utilizado por tempo indeterminado. Não é recomendado exceder a dose diária. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Ocasionalmente, podem ocorrer constipação, ligeiras cólicas abdominais, escurecimento e amolecimento das fezes, que regredem com a continuidade do tratamento. Reações de hipersensibilidade.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Procure orientação de um médico ou um centro de intoxicação imediatamente.

Onde e como devo guardar este medicamento?

O produto deve ser mantido em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C). TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características farmacológicas

As vitaminas e os minerais são micronutrientes essenciais para atender às necessidades nutricionais para o crescimento e o desenvolvimento normais e manutenção da saúde. Agem como co-fatores em reações bioquímicas, participando de diversas funções metabólicas. Os aminoácidos são elementos formadores das proteínas, principais constituintes de todos os tecidos orgânicos. Os aminoácidos são incorporados diretamente ao metabolismo orgânico e suas necessidades são maiores durante a fase do crescimento. Destaca-se a lisina que atua na formação e crescimento dos ossos, favorecendo a absorção de cálcio; também ajuda na produção de alguns hormônios e enzimas, na formação do colágeno e na regeneração do tecido lesado.

Resultados de eficácia

Por se tratar de um suplemento vitamínico-mineral, não há dados de eficácia disponíveis.

Indicações

Clusivol® Composto está indicado como suplemento de vitaminas, minerais e lisina nos seguintes casos:

- para lactentes e crianças em fase de crescimento;
- em dietas restritivas e inadequadas;
- na prevenção do raquitismo;
- na prevenção da cegueira noturna e xerofthalmia;
- como auxiliar do sistema imunológico;
- em doenças crônicas ou convalescença e
- no pós-cirúrgico.

Contra-indicação

Clusivol® Composto não deve ser utilizado por pessoas com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto

Agite antes de usar. Clusivol® Composto deve ser administrado diariamente nas doses recomendadas conforme tabela abaixo, em uma única tomada ou dividida em duas, preferencialmente junto às refeições. Pode ser diluído em água, chá, suco de frutas ou misturado a alimentos. Depois de aberto o produto deve ser mantido em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).

Posologia

Idades (anos)	Dose diária (mL)
1 a 3	2,5 a 5
4 a 6	5
7 a 11	10
Acima de 12 anos e adultos	20

Estas doses poderão ser alteradas conforme orientação médica.

Advertências

ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO CONTEM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES. ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE POSSAM FICAR GRÁVIDAS DURANTE O TRATAMENTO.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Não há relatos de intercorrências até o momento com o uso do produto por idosos e crianças. Pode ser necessária a redução da dose do suplemento nos casos de insuficiência renal ou hepática graves.

Interações medicamentosas

Os suplementos de vitaminas e minerais não são isentos de interações medicamentosas. Recomenda-se avaliação cuidadosa ao prescrever outro medicamento a usuários deste tipo de suplemento.

Reações adversas a medicamentos

Ocasionalmente, podem ocorrer constipação, ligeiras cólicas abdominais, escurecimento e amolecimento das fezes, que regredem com a continuidade do tratamento. Reações de hipersensibilidade.

Superdose

Em casos de ingestão acidental de doses muito acima das preconizadas, recomenda-se adotar medidas habituais de controle das funções vitais.


Armazenagem

O produto deve ser mantido em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 - 30°C).



TRAVEL DIRECTION

TRAVEL DIRECTION



MS nº 1.2110.0054
 Farm. Resp.: Edina S. M. Nakamura
 CRF-SP nº 9258

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.
 Rodovia Castelo Branco, km 32,5
 Itapevi - São Paulo - Brasil
 CNPJ nº 61.072.393/0039-06
 Indústria Brasileira

E1458-2

01.09



Wyeth®



Nome comercial: Clusivol® Composto
Nome genérico: polivitamínico, polimineral e lisina
Forma farmacêutica e apresentação comercializada referente a essa bula:
 Clusivol® Composto: frasco com 240mL

Xarope
 Acompanha copo-medida graduado

Uso oral
 USO PEDIÁTRICO E ADULTO
Leia sempre a bula. Ela traz informações importantes e atualizadas sobre o seu medicamento.

Composição:	Cada 1mL contém	% *				
		Crianças			Adultos	
		1-3 anos 5mL	4-6 anos 5mL	7-10 anos 10mL	20mL	
VITAMINAS						
vitamina A	(como palmitato de retinol)	250 UI	94	83	150	250
vitamina B ₁	(como cloridrato de tiamina)	0,07 mg	70	58	78	117
vitamina B ₂	(como fosfato sódico de riboflavina)	0,09 mg	90	75	100	138
vitamina B ₆	(como cloridrato de piridoxina)	0,08 mg	80	80	80	123
vitamina B ₁₂	(cianocobalamina)	0,3 mcg	167	125	167	250
vitamina C	(ácido ascórbico)	3,25 mg	54	54	93	144
vitamina D ₃	(colecalférol)	20 UI	50	50	100	200
colina	(como hemitartrato de colina)	0,43 mg	1	0,86	2	2
dexpantenol	(como pantotenato de cálcio)	0,6 mg	150	100	150	240
inositol		0,5 mg	**	**	**	**
nicotinamida		1 mg	83	62,5	83	125

AMINOÁCIDO						
lisina	(como cloridrato de lisina)	2,0 mg	**	**	**	**
SAIS MINERAIS						
cálcio	(como lactato de cálcio)	4 mg	4	3	6	8
ferro	(como gliconato ferroso)	0,3 mg	25	25	33	43
fósforo	(como hipofosfito de cálcio)	3 mg	3	3	2	9
iodo	(como iodeto de potássio)	7,5 mcg	50	34	75	115
magnésio	(como gliconato de magnésio)	0,3 mg	2,5	2	3	2
manganês	(como gliconato de manganês)	0,05 mg	21	17	33	43
potássio	(como gliconato de potássio)	0,25 mg	**	**	**	**
zinco	(como lactato de zinco)	0,05 mg	6	5	9	14

*%: Teor percentual do componente, na posologia indicada conforme as faixas etárias, relativo à ingestão mínima diária recomendada.

** : Não estabelecido.



TRAVEL DIRECTION