

Registrado e fabricado por:

**NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A.**

Rod. Jornalista F. A. Proença, km 08

Bairro Chácara Assay - CEP 13186-901

Hortolândia/SP - CNPJ: 72.593.791/0001-11

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

Comercializado por:

Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.

CNPJ: 05.044.984/0001-26

Farmacêutica Responsável:

Dr<sup>a</sup> Fernanda Bortolotti Batista

CRF-SP: 33.606

Registro ANVISA N°:81838110000

**N° de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho**

Serviço de atendimento ao consumidor  
0800 - 500600 - Discagem direta Gratuita  
sac@oftafarma.com.br - www.oftafarma.com.br



# ADAPTIS



**CARBOXIMETILCELULOSE  
SÓDICA 0,5%**

**CARBOXIMETILCELULOSE  
SÓDICA 1%**

**SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL**

**Ação:**

Lubrificante ocular externo em casos de insuficiência de secreção lacrimal ou lesão da córnea.

**ADAPTIS** é diferente das lágrimas multidosas por ser preservado no frasco conta-gotas por um conservante, perborato de sódio, que, após o contato com o tecido ocular, transforma-se em água pura e oxigênio, minimizando a irritação e citotoxicidade que poderia ser produzida pelos conservantes padrão. É indicado, portanto, para usuários de todos os tipos de lentes de contato.

**Indicações:**

**ADAPTIS**, é indicado para o alívio temporário dos desconfortos produzidos por secreção lacrimal insuficiente ou evaporação excessiva, exposição a vento, sol ou ambientes altamente contaminados, ou devido ao uso de lentes de contato; os quais levariam a uma inflamação da superfície ocular, causando sintomas de desconforto tais como ardência,

B80035



**D-MKT**

DEPTO. MARKETING:...../ /

DEPTO. REGISTRO:...../ /

DESENV. EMB.:...../ /

DESENV. GALÊNICO OU

TÉC. FARMACÊUTICO:...../ /

**OFTA**

Prova nº **04FINAL** 27/08/2019

Lucas

**Adaptis**

Código do Material:.....**B80035**

Código do Produto:.....31944/31945/99501

/99502/99503/99504

Faca:.....F-XXX

Cód. Laetus:.....380

Dimensões:.....240 x 150 mm

Anexo 2 do MP POP 82-001 Rev.02


Fonte:.....11

Espaçamento:.....11

Cor Pantone:.....Process Black C

Programa:.....InDesign CC 2018 (MAC)

Papel Gramatura:.....Papel sulfite 56 g/m<sup>2</sup>



prurido, secura, desconforto ao piscar, sensação de corpo estranho, fotofobia, entre outros. Tratamento sintomático de condições associadas à insuficiência lacrimal, tal como Síndrome do olho Seco e Síndrome de Sjogren.

**Composição:**

Cada 1 mL de solução oftálmica 0,5% contém:  
carboximetilcelulose sódica 5 mg; Triidrato Perborato de Sódio 0,28 mg;  
Ácido Bórico 12,03 mg; Borato de Sódio 0,33 mg; Cloreto de Sódio 2,70 mg; Água Purificada q.s.p. 1,00 mL.

Cada 1 mL de solução oftálmica 1% contém:  
carboximetilcelulose sódica 10 mg; Triidrato Perborato de Sódio 0,28 mg; Ácido Bórico 12,03 mg; Borato de Sódio 0,33 mg; Cloreto de Sódio 2,70 mg; Água Purificada q.s.p. 1,00 mL.

**Instruções de uso:**

Como dosagem orientadora, recomenda-se aplicar 1 ou 2 gota(s) no olho afetado 4 vezes ao dia ou conforme orientação médica.  
Modo de administração: inclinar o frasco conta-gotas para baixo, apertando-o delicadamente, e aplicar a dose na conjuntiva.

**Contraindicações:**

**ADAPTIS** é contraindicado em pacientes com conhecida hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Advertências:**

**ADAPTIS** não deve ser injetado. **ADAPTIS** não deve ser ingerido.  
Em caso de dor, irritação ou alteração de visão no olho tratado, ou se a condição piorar ou durar mais de 72 horas, interrompa o uso e entre em contato com o médico.  
Não use o produto após a data de validade indicada.  
Não use se a solução mudar de cor ou ficar turva.

**Precauções:**

Não encoste a ponta do conta-gotas no olho ou qualquer outra superfície para evitar contaminação do frasco. Feche o conta-gotas imediatamente após usar.  
Use o produto apenas se o recipiente estiver intacto.

**Reações adversas:**

Em casos raros, visão turva ou leve ardência passageira poderia ser produzida, desaparecendo quando o produto é distribuído suavemente pela superfície ocular.

**Informações ao paciente:**

Os pacientes devem ser orientados a manusear a tampa do conta-gotas de forma adequada, evitando o contato com os olhos e estruturas subjacentes ou qualquer outra superfície. A manipulação errada do conta-gotas pode contaminá-lo produzindo infecções oculares. O uso de produtos contaminados pode causar graves danos oculares, com subsequente redução da visão.  
O frasco deve ser fechado imediatamente após cada instilação. Não use o produto se a solução tiver mudado de cor ou estiver turva. O frasco fechado pode ser usado até a data de validade indicada no cartucho.

**Apresentação**

Frasco com conta-gotas contendo de 10 mL de solução oftálmica estéril.

**Condições de armazenamento:**

Manter à temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

**Estéril – Esterelizado por filtração**

**DESCARTE O PRODUTO APÓS UM MÊS DA ABERTURA.**

