

		
BULA CLINARIS		
DIMENSÕES: 210 x 185 mm		
Arquivo: 6108469/00 BULA CLINARIS		
Plataforma: InDesign CS4		
Prova nº: 03	Solicitação: 038/2014	Data: 12/05/14
Finalização: -		AST DESIGN
Nº de Cores: 01 cor		
■ BLACK		

CLINARIS

cloreto de sódio 0,9%

Solução de cloreto de sódio 0,9% - estéril

APRESENTAÇÃO

Spray nasal - solução de cloreto de sódio isenta de conservante 9,0mg/mL - estéril

Frasco spray contínuo contendo 100 ml.

USO NASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada ml de spray nasal contém:

cloreto de sódio..... 9 mg (0,9%)

excipientes q.s.p 1 ml

(fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

CLINARIS está indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

CLINARIS é uma solução isotônica, estéril, sem conservantes, que age fluidificando a secreção nasal, favorecendo a eliminação do muco e descongestionando o nariz. Dilui e remove o muco, e não agride a mucosa nasal.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CLINARIS é contraindicado para pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

Em crianças de colo (bebês) o tempo de aplicação do spray deve ser curto, de modo a não prejudicar sua respiração.

Este medicamento pode ser usado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CLINARIS deve ser conservado em temperatura ambiente (15°

a 30°C). Proteger da luz. Desde que respeitados os cuidados de armazenamento, o medicamento apresenta um prazo de validade de 24 meses a contar da sua data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

CLINARIS apresenta-se na forma de líquido límpido, transparente, incolor e inodoro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aplicar CLINARIS em cada narina, conforme a necessidade.

Modo de usar:



Retire a tampa protetora e introduza o bico aplicador em uma das narinas.



Com o dedo indicador pressione a base do bico aplicador para iniciar a nebulização. Mantenha pressionada pelo tempo necessário para uma boa higienização. Faça o mesmo procedimento na outra narina. Em bebês, o tempo de aplicação do spray deve ser curto.





Se necessário, assoe o nariz para remover as secreções já fluidificadas e o excesso do produto.



Repita o procedimento conforme sua necessidade. É recomendado lavar e secar o bico aplicador após sua utilização. Após o uso, colocar a tampa protetora do produto.

Como medida de higiene é recomendado o uso individual do produto.

Não introduza objetos no orifício de saída do líquido, para evitar danos à válvula.

CLINARIS pode ser usado em qualquer posição (360°), facilitando assim sua aplicação. A válvula de CLINARIS impede que o produto retorne ao frasco após a aplicação, evitando a contaminação.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de esquecimento de administração, reintroduzir a medicação novamente, procurando manter o interior nasal sempre úmido a fim de diluir o muco e descongestionar o nariz.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Ainda não foram relatadas reações adversas específicas com o uso do medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através de seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Ainda não foram descritos casos de superdosagem.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA - RDC ANVISA nº199/2006. AFE nº 1.00639-8

Farm. Resp.:Rafael de Santis

CRF-SP nº 55.728

Notificado por:

Takeda Pharma Ltda.

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5

Jaguariúna - SP

CNPJ 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco – SP

CNPJ 62.970.991/0001-92

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

SAC: 0800-7710345

www.takedabrasil.com

CLN_NSPC_0414



6108469/00
210x185mm