

EXTRALERG SL

Lisado de Germes Respiratórios

Imunomodulador

Forma Farmacêutica: Suspensão Oral

Via de Administração: USO SUBLINGUAL – SL

APRESENTAÇÕES

Frasco plástico com gotejador, com 15 mL da solução, contendo 11, 110 e 1100 mcg / mL, respectivamente 1ª, 2ª e 3ª série.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL de Extralerg SL 1ª série contém:

Lisado de Germes Respiratórios.....11 mcg

Cada mL de Extralerg SL 2ª série contém:

Lisado de Germes Respiratórios.....110 mcg

Cada mL de Extralerg SL 3ª série contém:

Lisado de Germes Respiratórios.....1100 mcg

Excipientes: Água para Injetáveis, Glicerol e Cloreto de Sódio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Extralerg SL é um medicamento imunomodulador auxiliar no tratamento de todas as infecções do trato respiratório superior, dos ouvidos, nariz e garganta. É recomendado como auxiliar imunológico

em bronquite aguda e crônica, dor de garganta, amigdalite, faringite, laringite, rinite, sinusite, otite (inflamação do ouvido), infecções resistentes a antibióticos convencionais, complicações bacterianas decorrentes de infecções virais do sistema respiratório, em particular em crianças e idosos.

2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Extralerg SL aumenta a resistência do organismo às infecções do trato respiratório e reduz a incidência, a duração, a gravidade e o risco de reaparecimento dos sintomas. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento.

3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Extralerg SL é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Informar ao médico em caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer gravidez durante o tratamento.

4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista

Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.

Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Não existem relatos sobre interação medicamentosa dos componentes da fórmula com outros medicamentos, alimentos, plantas medicinais e nos exames laboratoriais.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo

uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo da luz direta e em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Após aberto, conservar em geladeira, entre 2°C e 8°C. Extralerg SL pode ser armazenado por 36 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Depois de aberto, este medicamento pode ser utilizado até o fim do seu prazo de validade.

Extralerg SL é apresentado como líquido límpido, incolor a levemente amarelado. Pode apresentar pequenas partículas em suspensão.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Adultos: 3 gotas a cada 12 horas

Crianças: 2 gotas a cada 12 horas

Manter o frasco na posição adequada à aplicação e pingar a dose recomendada pelo médico. Aplicar gotas sob a língua. Manter o

medicamento entre 30 e 60 segundos em contato com a mucosa sublingual. Não há necessidade de aplicação em jejum.

Após a administração das gotas, não ingerir líquidos ou alimentos por 20 minutos. Via de Administração: Uso sublingual - SL

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar outra assim que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o intervalo determinado entre as doses. Não se deve dobrar a dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

O produto é bem tolerado e não há relatos de reações adversas. Podem ocorrer eventualmente reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com Extralerg SL.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula

do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.



Fabricado por:

Laboratório Extratos Alergênicos Ltda.

Av. Rio Branco, 277 Gr. 1201 - Rio de Janeiro-RJ

CNPJ: 28.614.626/0001-07

Reg. MS. 1.1729.0009

Farmacêutica Responsável:

M. Queiroz da Cruz – CRF-RJ 1560

Serviço de Atendimento ao Consumidor

(SAC): (21) 2262-4360/2220-4763

Venda sob prescrição médica

