

Sinustrat cloreto de sódio 9,0 mg/ml Luffa operculata - USO ADULTO E INFANTIL - USO NASAL COMPOSIÇÃO: cada mL contém: cloreto de sódio 9,0 mg cloreto de benzalcônio, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, álcool fenil etílico e água purificada q.s.p 1,0 mL 1 mL corresponde a 30 gotas. INFORMAÇÕES AO PACIENTE INDICAÇÕES: para instilações nasais em crianças e adultos. Em crianças é útil antes das mamadas e facilita a respiração durante o sono. Também indicado para pessoas que trabalham em ambientes com ar condicionado, que fazem longas viagens de avião e ficam expostas a ambientes com muita fumaça e outros poluentes, pois todos esses elementos também irritam as paredes internas das narinas, prejudicando a respiração. MODO DE AÇÃO: a secreção nasal provoca irritação nas paredes internas das narinas, fazendo com que inchem, deixando a respiração extremamente difícil e causando enorme desconforto. Sinustrat atua na secreção nasal, ajudando a sua eliminação. Com a saída da secreção nasal, as paredes internas desincham e a passagem do ar volta a ser livre, acabando com o desconforto. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: este medicamento deve ser armazenado em temperatura ambiente (15 a 30 OC). Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem. PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação. Vide cartucho. ATENÇÃO: Ao adquirir o medicamento confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do produto. Não utilize o produto fora do prazo indicado, pois pode ser ineficaz ou prejudicial a sua saúde. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação. "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término". "Informar ao médico se está amamentando". "Este medicamento pode ser utilizado por mulheres grávidas desde que sob orientação médica ou do cirurgião-dentista". CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO: "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento." INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO: "Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico." REAÇÕES ADVERSAS: apesar das reações adversas com Sinustrat serem muito baixas, o seu uso prolongado raramente pode causar quadros de rinite medicamentosa. "Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis." INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS: não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevante. CONTRAINDICAÇÕES: este medicamento está contraindicado em caso de hipersensibilidade individual aos componentes da fórmula e não deve ser utilizado em inaloterapia devido ao risco de ocorrer broncoespasmo. PRECAUÇÕES: a fim de diminuir o risco de transmissão de infecção, o conta-gotas não deve ser utilizado por mais de uma pessoa. O conta-gotas deve ser lavado com água fervida e seco após cada utilização. "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento." "NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE." "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS." INFORMAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS: Sinustrat é um descongestionante nasal que respeita a fisiologia da mucosa de acordo com a mais moderna orientação pediátrica. Através do soluto fisiológico, umedece o muco acumulado nas narinas, facilitando a sua expulsão e ao mesmo tempo promove a assepsia local. Possui um rápido início de ação e um tempo de ação antimicrobiana moderadamente longo. O cloreto de sódio na concentração em que está presente na formulação, não interfere no movimento ciliar da mucosa nasal. Esta propriedade é muito significativa, uma vez que os cílios da mucosa nasal estão relacionados com os mecanismos de proteção das fossas nasais, eliminando secreções e impurezas que possam vir a se depositar na mucosa nasal e assim, evitar um quadro de obstrução. INDICAÇÕES: como antisséptico e descongestionante nasal de uso tópico. CONTRAINDICAÇÕES: este medicamento está contraindicado em caso de hipersensibilidade individual aos componentes da fórmula e não deve ser utilizado em inaloterapia devido ao risco de ocorrer broncoespasmo. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: a fim de diminuir o risco de transmissão de infecção, o conta-gotas não deve ser utilizado por mais de uma pessoa. O contagotas deve ser lavado com água fervida e seco após cada utilização. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não existe uma evidência suficiente que confirme a ocorrência de interações clinicamente relevante. REAÇÕES ADVERSAS: apesar das reações adversas com Sinustrat serem muito baixas, o seu uso prolongado raramente pode causar quadros de rinite medicamentosa. POSOLOGIA: bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Em instilações, podem-se usar 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia. SUPERDOSAGEM: não há relatos de superdosagem com Sinustrat. PACIENTES IDOSOS: não existem recomendações específicas para pacientes idosos. Os mesmos cuidados devem ser seguidos. "SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA." VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Sinustrat cloridrato de nafazolina 0,5 mg/ml vasoconstritor - USO ADULTO FÓRMULA: cada mL contém cloridrato de nafazolina 0,5 mg excipientes: cloreto de sódio, cloreto de benzalcônio, álcool fenil etílico e água purificada q.s.p. 1 mL 30 gotas equivalem a 1 mL. INFORMAÇÕES AO PACIENTE MODO DE AÇÃO: SINUSTRAT VASOCONSTRITOR age como antisséptico e descongestionante nasal. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: este medicamento deve ser armazenado em temperatura ambiente (15 a 30OC). Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem. PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação. Vide cartucho. ATENÇÃO: Ao adquirir o medicamento, confira sempre o prazo de validade impresso na embalagem externa do

produto. Não utilize o produto fora do prazo indicado, pois pode ser ineficaz ou prejudicial à sua saúde. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: “Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término.” “Informar ao médico se está amamentando.” “Este medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez sem prescrição médica ou do cirurgião-dentista.” CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO: não use ininterruptamente, por longos períodos. A fim de diminuir o risco de transmissão de infecção, o gotejador não deve ser utilizado por mais de uma pessoa. “Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.” INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO: “Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.” REAÇÕES ADVERSAS: após o uso do medicamento, pode ocorrer irritação local passageira (queimação, ardência, espirros). Já foram descritas ocorrências de náusea e cefaleia. Pacientes diabéticos podem ter seu valor da glicemia elevado com o uso crônico da nafazolina. O uso crônico de SINUSTRAT VASOCONSTRITOR pode apresentar congestão nasal por efeito rebote e seu uso prolongado pode acarretar rinite medicamentosa. “Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.” INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase. O uso concomitante de SINUSTRAT VASOCONSTRITOR com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina. Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada. CONTRAINDICAÇÕES: SINUSTRAT VASOCONSTRITOR é contra indicado para pessoas hipersensíveis a qualquer componente da fórmula, para crianças menores de doze anos e durante a gravidez. Este medicamento destina-se ao uso tópico nasal, sendo contra indicado seu uso em inaloterapia. PRECAUÇÕES: utilizar com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares, hipertireoidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática e pacientes que apresentam forte reação a agentes simpatomiméticos, evidenciada por sinais de insônia ou vertigem. Não deve ser usado ininterruptamente, durante longos períodos. “TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.” “INFORME SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O TRATAMENTO.” “NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.” INFORMAÇÕES TÉCNICAS O cloridrato de nafazolina é um agonista alfaadrenérgico utilizado como vasoconstritor e descongestionante nasal, com rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos após a aplicação) e de efeito prolongado (entre 2 a 6 horas). A administração intranasal da nafazolina leva a um processo de constrição dos vasos dilatados da mucosa nasal, reduzindo o fluxo sanguíneo e o edema tissular. INDICAÇÕES: como antisséptico e descongestionante nasal. CONTRAINDICAÇÕES: SINUSTRAT VASOCONSTRITOR é contra indicado para pessoas hipersensíveis a qualquer componente da fórmula, para crianças menores de doze anos e durante a gravidez. Este medicamento destina-se ao uso tópico nasal, sendo contra indicado seu uso em inaloterapia. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: utilizar com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares, hipertireoidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática e pacientes que apresentam forte reação a agentes simpatomiméticos, evidenciada por sinais de insônia ou vertigem. Não deve ser usado ininterruptamente, durante longos períodos. Não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase. O uso concomitante de SINUSTRAT VASOCONSTRITOR com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina. Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada. REAÇÕES ADVERSAS: após o uso do medicamento, pode ocorrer irritação local passageira (queimação, ardência, espirros). Já foram descritas ocorrências de náusea e cefaleia. Pacientes diabéticos podem ter seu valor da glicemia elevado com o uso crônico da nafazolina. O uso crônico de SINUSTRAT VASOCONSTRITOR pode apresentar congestão nasal por efeito rebote e seu uso prolongado pode acarretar rinite medicamentosa. POSOLOGIA E MODO DE USAR: gotejar 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia. SUPERDOSAGEM: em casos de superdosagem, podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaleia, náuseas, vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do sistema nervoso central. Recomenda-se procurar serviço médico para medicação adequada conforme a gravidade do quadro clínico. PACIENTES IDOSOS: as mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens PRECAUÇÕES e CONTRAINDICAÇÕES.CA.