

Bula para o paciente

Artelac®

Hipromelose 3,2 mg/mL

Solução para uso oftálmico em frasco conta-gotas contendo 10 mL.

Uso pediátrico e adulto

Composição

Cada 1 mL de produto contém: 3,20 mg de hipromelose. Outros componentes: cetrimida, fosfato dissódico dodecahidratado, fosfato diidrogenado de sódio, edetato dissódico, sorbitol, água purificada. Cada mL equivale à 25 gotas.

Ação do medicamento

A hipromelose auxilia na manutenção do meio ocular, agindo com uma

substituta da lágrima. Artelac começa agir imediatamente após a instilação.

Indicações

Artelac é indicado para o tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e conjuntiva, causadas por secreção lacrimal deficiente e distúrbios funcionais resultantes de processos patológicos locais ou sistêmicos, bem como no caso de ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

Contra-indicação

Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

Precauções e Advertências

Produto exclusivo para uso oftálmico. Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da

aplicação do produto, e aguardar 15 minutos antes de recolocá-las.

Interações Medicamentosas

Não há registro de interações medicamentosas para Artelac.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Modo de uso

Artelac é um líquido transparente, livre de partículas visíveis em suspensão.

Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota de Artelac no saco conjuntival, de 3 a 5 vezes ao dia ou com maior frequência, caso seja necessário.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Reações adversas

Não há registro de reações adversas para Artelac.

Superdose

Não há registro de superdose.

Cuidados de conservação

Manter Artelac ao abrigo da luz e da umidade. Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).

Evitar tocar a ponta do frasco contágotas, para reduzir o risco de contaminação do produto.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 30 dias.

Registro MS nº 1.1961.0006

Farmacêutico Responsável: Ana Paula Ganzer CRF-RS: 9663

Fabricado por
Dr. Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik GmbH
13581 – Berlim – Alemanha

Importado e distribuído por
BL Indústria Ótica Ltda.
R. Dona Alzira, 139
Porto Alegre – RS
CNPJ 27.011.022/0001-03
SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor) 0800 702 6464

Bula para o profissional de saúde

Artelac®

Hipromelose 3,2 mg/mL

Solução para uso oftálmico em frasco
conta-gotas contendo 10 mL.

Uso pediátrico e adulto

Composição

Cada 1 mL de produto contém: 3,20
mg de hipromelose. Outros

componentes: cetrimida, fosfato dissódico dodecahidratado, fosfato dihidrogenado de sódio, edetato dissódico, sorbitol, água purificada.

Cada mL equivale a 25 gotas.

Características farmacológicas

A hipromelose auxilia na manutenção do meio ocular, substituindo a fase aquosa do fluido da lágrima e imitando a camada de mucina. A hipromelose se deposita entre as microvilosidades do epitélio corneano e, portanto, torna a superfície epitelial hidrofílica, de modo que o fluido lacrimal ou o componente aquoso de uma solução de lágrima artificial pode se espalhar sobre a camada de mucina e umidificar a superfície epitelial.

Indicações

Artelac é indicado para o tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e conjuntiva, causadas por secreção lacrimal deficiente e distúrbios funcionais resultantes de processos patológicos locais ou sistêmicos, bem como no caso de ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

Contra-indicação

Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

Modo de uso e cuidados de conservação

Artelac é um líquido transparente, livre de partículas visíveis em suspensão, para uso oftálmico (colírio).

Manter Artelac ao abrigo da luz e da umidade. Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).

Evitar tocar a ponta do frasco contendo gotas, para reduzir o risco de contaminação do produto.

Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 30 dias.

Posologia

Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota de Artelac no saco conjuntival, de 3 a 5 vezes ao dia ou com maior frequência, caso seja necessário.

Advertências

Produto exclusivo para uso oftálmico. Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da

aplicação do produto, e aguardar 15 minutos antes de recolocá-las.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

Interações Medicamentosas

Não há registro de interações medicamentosas para Artelac.

Reações adversas

Não há registro de reações adversas para Artelac.

Superdose

Não há registro de superdose.

Registro MS nº 1.1961.0006

Responsável técnico: Ana Paula
Ganzer CRF-RS: 9663

Fabricado por
Dr. Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik GmbH
13581 – Berlim – Alemanha

Importado e distribuído por
BL Indústria Ótica Ltda.
Rua Dona Alzira, 139
Porto Alegre – RS
CNPJ 27.011.022/0001-03
SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor) 0800 702 6464