

DISSOL

(*Persea gratissima*, *Chondrodendron platyphyllum*, *Jacaranda caroba*,
Rudgea viburnoides, *Echinodorus macrophyllus*, *Mikania hirsutissima*,
Phyllanthus niruri, *Sambucus nigra*)

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

DENOMINAÇÃO GENÉRICA

Nomenclatura oficial: *Persea gratissima*

Família: Lauraceae

Parte da planta utilizada: Folhas

Nomenclatura popular: Abacateiro

Nomenclatura oficial: *Chondrodendron platyphyllum*

Família: Menispermaceae

Parte da planta utilizada: Raiz

Nomenclatura popular: Abútua

Nomenclatura oficial: *Jacaranda caroba*

Família: Bignoniaceae

Parte da planta utilizada: Folhas

Nomenclatura popular: Caroba

Nomenclatura oficial: *Rudgea viburnoides*

Família: Rubiaceae

Parte da planta utilizada: Folhas

Nomenclatura popular: Congonha

Nomenclatura oficial: *Echinodorus macrophyllus*

Família: Alismataceae

Parte da planta utilizada: Folhas e talos

Nomenclatura popular: Chapéu de couro

Nomenclatura oficial: *Mikania hirsutissima*

Família: Asteraceae

Parte da planta utilizada: Toda parte aérea

Nomenclatura popular: Cipó cabeludo

Nomenclatura oficial: *Phyllanthus niruri*

Família: Euphorbiaceae

Parte da planta utilizada: Toda planta

Nomenclatura popular: Quebra pedra

Nomenclatura oficial: *Sambucus nigra*

Família: Caprifoliaceae

Parte da planta utilizada: Flores secas

Nomenclatura popular: Sabugueiro

APRESENTAÇÃO

Solução. Embalagem com um frasco contendo 150 ml.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada 100 ml contém:

Extrato aquoso *Persea gratissima* 0,34 ml

Extrato aquoso *Chondrodendron platyphyllum* 0,67 ml

Extrato aquoso *Jacaranda caroba* 0,34 ml

Extrato aquoso *Rudgea viburnoides* 0,34 ml

Extrato aquoso *Echinodorus macrophyllus* 0,67 ml

Extrato aquoso *Mikania hirsutissima* 0,67 ml

Extrato aquoso *Phyllanthus niruri* 0,67 ml

Extrato aquoso *Sambucus nigra* 0,34 ml

Veículos q.s.p. 100 ml

(Água deionizada, álcool, sacarose, propilparabeno e metilparabeno)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Dissol é destinado ao tratamento e dissolução dos cálculos renais e sua eliminação através da urina. Possui ação diurética, usado nas doenças renais e vias urinárias (uretrites, cistites, nefrites infecciosas), com a vantagem de provocar diurese abundante, porém retendo a albumina. Empregado nas afecções hepáticas, obstruções do fígado e hemorragia.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Dissol age no processo de dissolução dos cálculos renais e sua eliminação através da urina, combatendo as cólicas renais e abdominais.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

"Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes diabéticos e menores de 2 (dois) anos."

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

Deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois estas alteram o efeito do produto.

O uso de outros medicamentos, juntamente com Dissol deve ser feito sob orientação médica. Pessoas acima de 65 anos devem consultar seu médico para o ajuste posológico.

"Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE."

"Este medicamento contém ÁLCOOL."

Informe seu médico se está amamentando e/ou a ocorrência de gravidez, durante o tratamento com Dissol, ou após seu término.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Por ser um produto de origem vegetal, poderá sofrer pequenas variações na coloração, eventualmente, formar um depósito no fundo do frasco ou turvar quando agitado, o que não prejudica a pureza do produto, conservando todas as propriedades terapêuticas que lhe são inerentes.

Interações medicamentosas

Até o momento não foram relatadas interações de outros fármacos com as substâncias contidas neste produto.

“Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.”

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Dissol deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em sua embalagem original. Proteger da luz e umidade.

“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”

“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.”

Características físicas

Líquido de cor castanho.

Características organolépticas

Sabor e odor (cheiro) característicos.

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.”

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Agitar o produto antes de usar.

Posologia:

Adultos: Ingerir 15 ml, via oral, quatro vezes ao dia, de seis em seis horas. A dose diária não deve ultrapassar 60 ml.

Crianças: Ingerir 5 ml, via oral, três vezes ao dia, de oito em oito horas. A dose diária não deve ultrapassar 15 ml.

“Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.”

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.”

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações adversas

Até o momento não foram relatadas reações adversas graves e que coloquem em risco a saúde dos pacientes.

Se houver o aparecimento de reações desagradáveis como: coceira, vermelhidão na pele (tipo reação alérgica), irritação, diarreia, azia e palpitações cardíacas, suspender o uso e procurar orientação médica.

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.”

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Até o momento são desconhecidos os efeitos prejudiciais em casos de ingestão exagerada desse produto.

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.”

“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.”

Farmacêutico Responsável: Caroline Guareschi Amorim – CRF/MG nº 17.657

Laboratório Belém Jardim Indústria e Comércio Ltda

Av. Waldomiro Lobo, 641 – B. Guarani – Belo Horizonte / MG

CEP: 31.814-620 – CNPJ: 17.299.140/0001-05 – Indústria Brasileira

Cadastro de Isonção no MS: 00035/90