

# AGONIADA

*Plumeria lancifolia*

## MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

### DENOMINAÇÃO GENÉRICA

**Nomenclatura oficial:** *Plumeria lancifolia*

**Família:** Apocynaceae

**Parte da planta utilizada:** Casca do caule

**Nomenclatura popular:** Agoniada

### APRESENTAÇÃO

Solução. Embalagem com um frasco contendo 150 ml.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 14 ANOS

### COMPOSIÇÃO

Cada 100 ml contém:

Extrato aquoso *Plumeria lancifolia*.....4,33 ml

Veículos q.s.p. ....100 ml

(Água deionizada, álcool, sacarose, propilparabeno e metilparabeno)

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Agoniada é destinado ao tratamento dos distúrbios ginecológicos, com ação eficaz nas inflamações do útero, amenorréia, dismenorréia e cólicas menstruais.

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Agoniada tem ação direta sobre o útero, descongestionando, auxiliando e regularizando as menstruações difíceis e irregulares.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

"Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes diabéticos, menores de 14 (quatorze) anos, mulheres grávidas e/ou que estão amamentando."

#### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Precauções e advertências

Deve-se evitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois estas alteram o efeito do produto.

O uso de outros medicamentos, juntamente com Agoniada deve ser feito sob orientação médica.

Pessoas acima de 65 anos devem consultar seu médico para o ajuste posológico.

"Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE."

"Este medicamento contém ÁLCOOL."

Informe seu médico se está amamentando e/ou a ocorrência de gravidez, durante o tratamento com Agoniada, ou após seu término.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Por ser um produto de origem vegetal, poderá sofrer pequenas variações na coloração, eventualmente, formar um depósito no fundo do frasco ou turvar quando agitado, o que não prejudica a pureza do produto, conservando todas as propriedades terapêuticas que lhe são inerentes.

##### Interações medicamentosas

Até o momento não foram relatadas interações de outros fármacos com as substâncias contidas neste produto.

**"Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento."**

#### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Agoniada deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em sua embalagem original. Proteger da luz e umidade.

**“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”**

**“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.”**

#### **Características físicas**

Líquido de cor castanha.

#### **Características organolépticas**

Sabor amargo e odor (cheiro) característico.

**“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.”**

**“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”**

#### **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Modo de usar**

Agitar o produto antes de usar.

##### **Posologia:**

Adultos: Ingerir 15 ml, via oral, quatro vezes ao dia, de seis em seis horas. A dose diária não deve ultrapassar 60 ml.

Puberdade: Ingerir 15 ml, via oral, duas vezes ao dia, de doze em doze horas. A dose diária não deve ultrapassar 30 ml.

**“Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.”**

#### **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

**“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.”**

#### **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

##### **Reações adversas**

Até o momento não foram relatadas reações adversas graves e que coloquem em risco a saúde dos pacientes.

Se houver o aparecimento de reações desagradáveis como: coceira, vermelhidão na pele (tipo reação alérgica), irritação, diarreia, azia e palpitações cardíacas, suspender o uso e procurar orientação médica.

**“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.”**

#### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento são desconhecidos os efeitos prejudiciais em casos de ingestão exagerada desse produto.

Em caso de superdosagem, suspender o uso e procurar orientação médica de imediato.

**“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.”**

**“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.”**

**Farmacêutico Responsável: Caroline Guareschi Amorim – CRF/MG nº 17.657**

**Laboratório Belém Jardim Indústria e Comércio Ltda**

**Av. Waldomiro Lobo, 641 – B. Guarani – Belo Horizonte / MG**

**CEP: 31.814-620 – CNPJ: 17.299.140/0001-05 – Indústria Brasileira**

**Cadastro de Isenção no MS: 00043/90**