

## paracetamol



Apresentação 750mg com 20 Comprimidos  
 Divisão Genéricos  
 Princípio(s) Ativo(s) paracetamol  
 Categoria Dor e Febre  
 Medicamento Referência Tylenol® (Janssen Cilag)  
 Registro ANVISA 1.5584.0158  
 Indicações  
 Indicações: Analgésico e antipirético.  
 Observações

Palavras Chaves

### Valores

REGIÃO	ICMS	PF	PMC
DEMAIS ESTADOS	17,00%	R\$ 10,88	R\$ 14,51
ZONA FRANCA	17,00%	R\$ 9,47	R\$ 13,10
RO	17,50%	R\$ 10,96	R\$ 14,60
ZONA FRANCA-RO	17,50%	R\$ 9,53	R\$ 13,18
AM, AP, BA, MA, PB, PE, RN, RS, SE, TO, PR, PI, Para similares: MG e SP	18,00%	R\$ 11,04	R\$ 14,70
ZONA FRANCA- AM, AP	18,00%	R\$ 9,59	R\$ 13,26
RJ	20,00%	R\$ 11,36	R\$ 15,12
Para Genéricos: MG e SP	12,00%	R\$ 10,18	R\$ 13,60

### Bula

paracetamol

Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.

Comprimido

750mg

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

paracetamol

## APRESENTAÇÕES

Comprimido.

Embalagem com 20 comprimidos.

Display contendo 200 comprimidos.

## VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

paracetamol.....750mg

excipientesq.s.p..... 1comprimido

(povidona, amido, amidoglicolato de sódio, amido pré-gelatinizado e ácido esteárico).

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O paracetamol reduz a febre atuando no centro regulador da temperatura no Sistema Nervoso Central (SNC) e diminui a sensibilidade para a dor. Seu efeito tem início 15 a 30 minutos após a administração oral e permanece por um período de 4 a 6 horas.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve usar este medicamento se tiver alergia ao paracetamol ou a qualquer componente de sua fórmula.

Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar mais do que a dose recomendada (superdose) para provocar maior alívio, pois pode causar sérios problemas de saúde. Você deve consultar seu médico se a dor ou febre continuarem ou piorarem, ou se surgirem novos sintomas, pois estes sintomas podem ser sinais de doenças graves.

Uso com álcool: consumidores de doses abusivas de álcool devem consultar seu médico para saber se podem tomar paracetamol ou qualquer outro analgésico.

## Gravidez e Amamentação

Se você estiver grávida ou amamentando, consulte o seu médico antes de usar este medicamento.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso em pacientes com problemas no fígado: Consulte seu médico antes de usar o medicamento.

Uso em idosos: Até o momento não são conhecidas restrições específicas ao uso de paracetamol por pacientes idosos. Não existe necessidade de ajuste da dose neste grupo etário.

Muito raramente, foram relatadas reações cutâneas graves em pacientes que administraram paracetamol. Os sintomas podem incluir: vermelhidão na pele, bolhas e erupções cutâneas. Se ocorrerem reações cutâneas ou piora de problemas de pele já existentes, interrompa o uso do medicamento e procure ajuda médica imediatamente.

Não use outro produto que contenha paracetamol.

A absorção de paracetamol é mais rápida se você estiver em jejum. Os alimentos podem afetar a velocidade da absorção, mas não a quantidade absorvida do medicamento. A interferência do paracetamol na metabolização de outros medicamentos e a influência destes medicamentos na ação e na toxicidade do paracetamol, em geral, não é relevante.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: comprimido oblongo e branco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso oral. Você deve tomar os comprimidos com líquido. O paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições.

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 comprimido, 3 a 5 vezes ao dia.

A dose diária máxima recomendada de paracetamol é de 4000mg (5 comprimidos de paracetamol 750mg) administrada em doses fracionadas, não excedendo 1000mg/dose (1 comprimido de paracetamol 750mg), em intervalos de 4 a 6 horas, em um período de 24 horas.

Duração do tratamento: depende do desaparecimento dos sintomas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

#### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de tomar uma dose do medicamento, faça-o assim que se lembrar, caso de ainda haja necessidade, e então ajuste o horário das próximas tomadas. Não tome a dose dobrada para compensar a dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

#### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis inesperadas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento.

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): urticária, coceira e vermelhidão no corpo, reações alérgicas a este medicamento e aumento das transaminases.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

#### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O uso de doses excessivas, acima das doses recomendadas (superdose) pode causar danos ao fígado. Em caso de superdose, procure ajuda médica ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental para adultos e crianças, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estiverem presentes.

Os sinais e sintomas iniciais que se seguem a uma dose potencialmente hepatotóxica de paracetamol são: anorexia, náusea, vômito, sudorese intensa, palidez e mal-estar geral.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

[http://4.bp.blogspot.com/\\_nw\\_OyqIkW4k/TBfJfti4QWI/AAAAAAAAAH0/z4yBq0dF9Ss/s320/logo\\_reciclagem.jpg](http://4.bp.blogspot.com/_nw_OyqIkW4k/TBfJfti4QWI/AAAAAAAAAH0/z4yBq0dF9Ss/s320/logo_reciclagem.jpg)  
III – DIZERES LEGAIS:

Registro M.S. nº 1.5584.  
0158

Farm. Responsável: Dr  
.  
Marco Aurélio Limirio G. Filho  
-  
CRF  
-  
GO nº 3.524

Nº do Lote, Data  
de Fabricação e Prazo de Validade:  
VIDE CARTUCHO

Siga corretamente o modo de usar, não de  
sa  
parecendo os sintomas procure orientação médica  
.

Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.

VPR 1

-

Quadra 2

-

A

-

Módulo 4

-

DAIA

-

Anápolis

-

GO

-

CEP 75132

-

020

C.N.P.J.:

05

.

161

.

069

/0001

-

10

-

Indústria Brasileira

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica

Dados da petição/notificação que altera bula

Dados das alterações de bulas

Data do  
expediente

No. expediente

Assunto

Data do  
expediente

Nº do  
expediente

Assunto

Data de  
aprovação

Itens de bula

Versões

(VP/VPS)

Apresentações  
relacionadas

02/05/2014

0333977/14-7

10459 - GENÉRICO  
- Inclusão Inicial de  
Texto de Bula –  
RDC 60/12

02/05/2014

0333977/14-7

10457- SIMILAR -  
Inclusão Inicial de  
Texto de Bula –  
RDC 60/12

02/05/2014

Inclusão inicial

VP/VPS

Comprimido

27/01/2015

10452 -GENÉRICO  
– Notificação de  
Alteração de Texto  
de Bula – RDC  
60/12

27/01/2015

10452 -GENÉRICO  
– Notificação de  
Alteração de Texto  
de Bula – RDC  
60/12

27/01/2015

## 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

(Inclusão de Informações de advertências e  
precauções a respeito de uso em pacientes com  
hepatopatias e nefropatias)

VPS

Comprimido

