

Toarip (aripiprazol). **Registro MS 1.0525.0076. Uso adulto, Via Oral. Composição, Formas farmacêuticas e Apresentações:** cada comprimido contém 10mg, 15mg, 20mg ou 30mg, embalagens com 10 ou 30 comprimidos **Indicações:** esquizofrenia; transtorno bipolar do tipo I em monoterapia ou em terapia adjuntiva ao lítio ou valproato. **Contraindicações:** pacientes hipersensíveis ao aripiprazol ou qualquer um dos seus componentes **Gravidez e Lactação:** categoria C; recomenda-se que mulheres que estejam recebendo aripiprazol não amamentem **Precauções e advertências:** aripiprazol não é aprovado para o tratamento de pacientes com psicose associada à demência; Síndrome Neuroléptica Maligna pode ocorrer com a administração de drogas antipsicóticas, incluindo aripiprazol; aripiprazol pode causar hipotensão ortostática possivelmente em virtude de seu antagonismo ao receptor α 1-adrenérgico; aripiprazol deve ser utilizado com cautela em pacientes com histórico de convulsões ou com condições que reduzam o limiar convulsivo, como no caso de demência de Alzheimer **Reações adversas:** náusea, vômito, constipação, cefaleia, vertigem, acatisia, ansiedade, insônia, inquietação, sintomas extrapiramidais, distonia, ideação suicida **Interações medicamentosas:** aripiprazol possui potencial de intensificar os efeitos de certos agentes anti-hipertensivos; indutores de CYP3A4 (como carbamazepina) podem causar uma elevação no *clearance* de aripiprazol e redução nos níveis séricos; inibidores de CYP3A4 (como cetoconazol) ou CYP2D6 (como quinidina, fluoxetina ou paroxetina) podem inibir a eliminação de aripiprazol e causar elevação nos níveis séricos **Posologia:** esquizofrenia – 10mg/ dia ou 15mg/ dia até 30mg/dia, uma vez ao dia; transtorno bipolar – 15mg/ dia até 30mg/ dia, uma vez ao dia **(Outubro/ 18). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA.** Informações adicionais, vide bula completa.

“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”.

Contraindicação: Hipersensibilidade ao aripiprazol ou qualquer um dos seus componentes

Interação Medicamentosa: Possui potencial de intensificar os efeitos de certos agentes anti-hipertensivos

Toarip é um medicamento. Durante o seu uso não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas.