

Nestes casos, os sintomas mais comuns que podem aparecer são dor de estômago, enjoo, vômito e diarreia. O médico deve ser imediatamente comunicado e, provavelmente, deverá ser feita uma lavagem gástrica, devendo o paciente ser mantido sob cuidadosa observação médica.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Conserve o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Nº de lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho

Reg. MS nº 1.4381.0094

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra – CRF-MG nº 10.883

Fabricado por:

Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750

CEP: 37550-000 - Pouso Alegre/MG

CNPJ: 02.814.497/0002-98

Indústria Brasileira

Registrado por:

Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Rua Engenheiro Prudente, 121

CEP: 01550-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.814.497/0001-07

carbocisteína

Medicamento genérico – Lei nº 9.787, de 1999



Forma Farmacêutica e Apresentação:

Xarope adulto: Frasco com 100 mL

Xarope pediátrico: Frasco com 100 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 5 ANOS USO ORAL

Composição:

Cada mL do **xarope adulto** contém:

carbocisteína 50 mg

Veículo* q.s.p.: 1 mL

* carmelose, sacarina sódica, ciclamato de sódio, propilparabeno, metilparabeno, hidróxido de sódio, corante vermelho eritrosina, ácido cítrico, álcool etílico, água purificada e aroma de cereja.

Cada mL do **xarope pediátrico** contém:

carbocisteína 20 mg

Veículo* q.s.p.: 1 mL

* carmelose, sacarina sódica, ciclamato de sódio, propilparabeno, metilparabeno, hidróxido de sódio, corante vermelho eritrosina, ácido cítrico, álcool etílico, água purificada e aroma de cereja.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

Carbocisteína ajuda a diminuir a produção das secreções respiratórias, assim como deixa as secreções menos espessas, facilitando sua eliminação pelo organismo, quando há um excesso destas secreções por doenças respiratórias.

A carbocisteína começa a fazer efeito cerca de 1 a 2 horas após a sua administração.

Por que este medicamento foi indicado?

Carbocisteína ajuda no tratamento de problemas respiratórios, quando há um excesso de secreções que podem piorar o estado do paciente.



2300181BU0714 - 183 x 130 - PH 686

Quando não devo usar este medicamento?

Contraindicações

O produto não deve ser utilizado por pacientes com úlceras no estômago ou no duodeno ou com alergia aos componentes da formulação.

Advertências

O tratamento com carbocisteína não substitui o tratamento específico das doenças respiratórias, como a bronquite, a asma ou as infecções dos pulmões. Assim, antes de começar o tratamento com carbocisteína, o médico deve ser consultado para diagnosticar o tipo de doença, e indicar o tratamento ou medicamento específico para cada doença.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 5 anos de idade.

Precauções

Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pacientes idosos

Não existem restrições ou precauções especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos.

Interações medicamentosas

Ingestão juntamente com outras substâncias

Durante o tratamento com carbocisteína, você não deve fazer uso de medicamentos que inibem a tosse como os antitussígenos, bem como não deve fazer uso de medicamentos atropínicos (como por exemplo, atropina).

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Como devo usar este medicamento?

Aspecto físico

Carbocisteína xarope adulto é um líquido límpido, rosa claro e isento de partículas estranhas.

Carbocisteína xarope pediátrico é um líquido límpido, rosa claro e isento de partículas estranhas.

Características organolépticas

Carbocisteína xarope adulto e pediátrico possuem odor e sabor artificial de cereja.

Leia com atenção o item “Modo de usar” para a utilização correta do produto.

Modo de usar

Xarope adulto:

5 a 10 ml (para medir o volume, utilize o copo-medida) do xarope 3 vezes ao dia.

Xarope pediátrico:

• Crianças entre 5 e 12 anos de idade: 5 a 10 ml (para medir o volume, utilize o copo-medida) do xarope 3 vezes ao dia.

Atenção:

Para medir o volume de carbocisteína Xarope, utilize o copo-medida verificando a posologia a ser adotada.

Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

O prazo de validade está impresso na embalagem do produto.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Às vezes, este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis como: dor no estômago, enjoo, diarreia, sangramento no estômago ou intestinos, alergia na pele, tontura, insônia, dor de cabeça, palpitação e leve diminuição da taxa de açúcar no sangue. Informe ao seu médico o aparecimento destas ou de quaisquer outras reações desagradáveis.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?