

# Fumasil®

## Caladium seguinum + associação

### Medicamento Homeopático

#### Apresentações

Embalagem contendo 60 comprimidos.

Embalagem contendo 120 comprimidos.

#### Comprimido orodispersível

#### USO ORAL • USO ADULTO

#### COMPOSIÇÃO:

Cada comprimido de 300 mg contém:

*Argentum nitricum*.....7 DH.....0,0075 mL

*Caladium seguinum*.....20 DH.....0,0075 mL

*Lobelia inflata*.....4 DH.....0,0075 mL

*Plantago major*.....2 DH.....0,0075 mL

Excipiente q.s.p.....300 mg

Excipiente: lactose monoidratada,

amido pré-gelatinizado e estearato de

magnésio.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

#### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

FUMASIL® é indicado como auxiliar na redução do desejo intenso de fumar.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

“As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.”

FUMASIL® é um medicamento homeopático indicado para auxiliar no combate ao tabagismo.

Medicamentos homeopáticos são indicados segundo a individualidade de cada paciente, e não para doenças específicas. A dose do medicamento homeopático é individualizada para cada paciente.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Quando o paciente for hipersensível aos componentes da fórmula.

Não foram relatadas, até o momento, contraindicações ao uso do medicamento FUMASIL®.

**Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista (categoria “C”).**

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não é recomendada a ingestão de FUMASIL® junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes ou depois da refeição. Não foram relatados, até o momento, efeitos secundários conhecidos do FUMASIL®. Caso suspeite de algum efeito colateral após ingerir FUMASIL®, por favor, informe ao seu médico ou farmacêutico.

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.**

**Informe ao seu prescritor se estiver amamentando.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião dentista.**

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Os comprimidos do FUMASIL® são redondos e de coloração branca. O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide embalagem), desde que o medicamento seja conservado em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Mantenha o medicamento em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Número de lote, data de fabricação e de validade: vide embalagem.

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento dentro do prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento se apresenta na forma de comprimido orodispersível, que se desintegra ou se dissolve rapidamente quando colocado sobre a língua, sem a ingestão de água. É importante deixar o comprimido dissolver sobre a língua. Não mastigar ou engolir por inteiro. Não é recomendada a ingestão de FUMASIL® junto com as refeições. Deve ser ingerido, preferencialmente, meia hora antes ou depois da refeição.



A dose recomendada e a duração do tratamento dependem da resposta individual de cada paciente ao tratamento. Porém, é geralmente recomendada a manutenção do tratamento até a diminuição dos sintomas. Segue esquema posológico de uso adulto sugerido como referência.

#### Posologia sugerida

1º dia de tratamento:  
1 comprimido a cada 1 hora por via oral.  
2º dia de tratamento:  
1 comprimido a cada 2 horas por via oral.  
3º dia de tratamento:  
1 comprimido a cada 3 horas por via oral.  
4º dia de tratamento:  
1 comprimido a cada 4 horas por via oral.  
5º dia de tratamento:  
1 comprimido a cada 5 horas por via oral.  
6º dia de tratamento:  
1 comprimido a cada 6 horas por via oral.  
Após o 6º dia de tratamento:  
manter a posologia de 1 comprimido a cada 6 horas por via oral.

Não é necessário o uso de Fumasil no período em que estiver dormindo. Você pode aumentar a dose caso sinta necessidade, caso isso aconteça, apenas recomendamos não exceder a quantidade de 18 comprimidos ao dia.

Recomenda-se manter a posologia de 1 comprimido a cada 6 horas por um período mínimo de 90 dias ou até o completo abandono do fumo.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido neste folheto. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde". No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência."

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvida sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

#### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nenhum efeito prejudicial deve ser esperado se você interromper pontualmente a administração de Fumasil®.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico, ou de seu médico, ou cirurgião dentista.**

**Caso você se esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

Você pode tomar a dose recomendada deste medicamento assim que se lembrar.

#### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são relatados e conhecidos males e limitações de uso dos medicamentos homeopáticos.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião dentista.**

**Não foram realizados estudos em animais ou em mulheres grávidas.**

**Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento.**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

#### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A melhor conduta em uma situação destas é a de esperar e observar. Aumente a ingestão de líquidos. Caso ocorram vômitos, enjoos ou qualquer outro sintoma perceptível procure uma ajuda emergencial médica.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

"Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 238/2018"

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

Farm. Resp.: Dra. Líbia Bentes Machado  
CRF-PE nº 2991

Notificado por:  
**VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Rodovia BR-232, Km 63, s/n  
Parque Industrial - Pombos - PE  
CNPJ 03.993.167/0001-99  
Indústria brasileira

0800 025 0110  
sac@fpm.com.br

S0000550119-01  
BU AB 150 x 300 mm  
At0000417

