



I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Folifolin®
ácido fólico



APRESENTAÇÃO

Comprimido de 5 mg: Embalagem com 4, 10, 20, 30, 40, 60 e 500 comprimidos.

USO ORAL
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Composição	Concentração	IDR**
ácido fólico	5 mg	2083.30%
excipiente* q.s.p.	1 comprimido	-

* amido, lactose, talco e ácido esteárico.
** Ingestão Diária Recomendada

II - INFORMAÇÃO AO PACIENTE

1. PARA QUE ESSE MEDICAMENTO É INDICADO?

Folifolin® está indicado no tratamento das anemias devido à deficiência do ácido fólico, uma vitamina essencial para o organismo humano.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Folifolin® é uma vitamina essencial na multiplicação

celular de todos os tecidos, já que participa da formação do DNA (ácido que contém toda a informação genética de cada indivíduo) e que é necessário para a divisão celular (processo no qual uma célula divide-se em duas ou quatro células, em que cada uma contém todo o material genético – DNA).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Folifolin® é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade ao ácido fólico ou outro componente da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Folifolin® só deve ser indicado no tratamento da anemia perniciosa, se associado a doses adequadas de cianocobalamina.

O aparecimento de coloração amarela na urina é consequente à eliminação do próprio medicamento (ou de seus derivados) e não tem significado de doença, não devendo causar preocupação ao paciente e não requer atenção médica.

Doses elevadas (acima de 15 mg/dia) podem comprometer a absorção intestinal do zinco, além de estarem relacionadas com o surgimento de reações adversas, visto que este medicamento é bem tolerado.

Gravidez e Lactação: **Folifolin®** é um medicamento vitamínico complementar essencial na gestação e na

lactação. Informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe o médico se estiver amamentando.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Idosos: **Folifolin®** pode ser usado por pacientes acima de 65 anos de idade, desde que observadas às precauções comuns ao produto.

Interações medicamentosas

O uso de **Folifolin®** concomitantemente com analgésicos, anticonvulsivantes, contraceptivos orais, metotrexato, pirimetamina, quinina e trimetoprima diminuem seu efeito terapêutico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter em temperatura ambiente (15°C e 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Código do Material: 084540	
Dimensões:.....295 x 150 mm	Programa: QuarkXpress (MAC)
Material:Papel sulfite 50 g/m²	Prova n°: ..02Final 12/08/2015
Cor Pantone: ..Process Black C	Designer: Antonio
N° da Arte:BU-1575	EMS
LAETUS:.....41	

APROVAÇÃO DE ARTE FINAL		
ÁREA	VISTO	DATA
Desenv. Embalagem	_____	_____
Depto. Marketing	_____	_____
Desenv. Galênico	_____	_____
Registro de Produto	_____	_____

times new roman
tam: 11 esp: 12



084540



<p>Aspecto físico e características organolépticas: Comprimido amarelo circular e biconvexo.</p> <p>Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.</p> <p>Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.</p>	<p>Tome a dose assim que se lembrar dela. Entretanto, se estiver próximo o horário da dose seguinte, salte a dose esquecida e continue o tratamento conforme orientação do médico. Não utilize o dobro da dose para compensar uma dose esquecida.</p> <p>Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.</p>	<p>9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTA? Mesmo a ingestão de doses elevadas de ácido fólico não acarretam sintomas relevantes. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.</p>
<p>6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Folifolin® comprimido, deve-se utilizar 1 comprimido de 5 mg, 1 vez ao dia.</p>	<p>8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? O medicamento é bem tolerado, entretanto podem ocorrer algumas reações adversas:</p>	<p>III - DIZERES LEGAIS Reg. MS. nº 1.0235.0372 Farm. Resp.: Dr. Ronoel Caza de Dio CRF-SP 19.710</p>
<p>Interrupção do tratamento No tratamento das anemias megaloblásticas por carência de ácido fólico, a interrupção pode retardar a cura da doença. Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.</p>	<p>Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas, doença pulmonar broncoespástica, eritema (vermelhidão na pele em consequência de uma inflamação), prurido (coceira) na pele, <i>rash</i> cutâneo (vermelhidão na pele).</p>	<p>Registrado por: EMS S/A Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, km 08 Bairro Chácara Assay CEP 13186-901 - Hortolândia/SP CNPJ: 57.507.378/0003-65 INDÚSTRIA BRASILEIRA</p>
<p>Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.</p>	<p>Reações com frequência desconhecida: desconforto gástrico</p>	<p>Fabricado por: NOVAMED FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Manaus/AM</p>
<p>7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?</p>	<p>Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.</p>	<p>VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 22/05/2014.</p>



BU-1575 / LAETUS-41 - 285x150mm