

**Superdosagem:**

A ingestão de doses excessivas do produto pode provocar cólicas abdominais, vômitos e diarreias. Doses equivalentes a 8-12g de Sene, podem acarretar quadros de desidratação, se não houver uma reposição de líquido adequada.

• **Pacientes idosos:** Veja o item "geriatria" em "Precauções e advertências".

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.  
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Registro MS – 1.1270.0020  
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior  
CRF-SP nº 5143

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade:  
vide cartucho/rótulo.

*Produzido por:*  
Relthy Laboratórios Ltda.  
Avenida José Vieira, 446  
Indaiatuba - SP

**BIOLAB**

*Distribuído por:*  
**BIOLAB SANUS** Farmacêutica Ltda.  
Av. Paulo Ayres, 280 – Taboão da Serra – SP  
CEP 06767-220 SAC 0800 724 6522  
CNPJ 49.475.833/0001-06  
Indústria Brasileira

Faca: 160 x 150 mm

EE 022010 A

# FONTOLAX<sup>®</sup>

*Sene + Associações*

**FITOTERÁPICO**



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

• **Forma farmacêutica e apresentação:**

Cápsula gelatinosa mole: caixa com 20 cápsulas.

• **USO ADULTO OU PEDIÁTRICO (CRIANÇAS MAIORES DE 8 ANOS).**

• **Composição:**

**Cápsula gelatinosa mole**

Cada cápsula gelatinosa mole contém:

Extrato Seco de Sene (*Cassia angustifolia* Vahl) 45% (\*) ..... 22,5 mg  
Extrato Seco de *Cassia fistula* Linné ..... 19,5 mg  
Extrato Seco de Tamarindo (*Tamarindus indica* Linné) ..... 19,5 mg  
Extrato Seco de Coentro (*Coriandrum sativum* Linné) ..... 9,0 mg  
Extrato Seco de Alcaçuz (*Periandra mediterrânea* Taubert) ..... 4,0 mg  
Veículo oleoso q.s.p ..... 1 cápsula  
Veículo: óleo de soja, lecitina de soja, cera de abelha, gordura vegetal hidrogenada, dióxido de titânio.

(\*) equivalente a 10 mg de senosídeos por cápsula.



## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• **FONTOLAX<sup>®</sup>** combina a ação de cinco substâncias vegetais que auxiliam na regulação da função intestinal.

• Mantenha **FONTOLAX<sup>®</sup>** em temperatura ambiente (15 a 30°C), protegido da luz e da umidade.

• **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação. Não utilize medicamentos com a validade vencida.

• Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento com **FONTOLAX<sup>®</sup>** ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. **FONTOLAX<sup>®</sup>** não deve ser utilizado durante os 3 primeiros meses de gravidez.

• Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento com **FONTOLAX<sup>®</sup>**.

•Não interrompa o tratamento com FONTOLAX<sup>®</sup> sem o conhecimento do seu médico. A doença e/ou seus sintomas poderão retornar.

•Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Podem ocorrer, ocasionalmente, diarreia, cólicas ou vômitos, que desaparecem com a suspensão do uso ou redução da dose.

•**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

•**Contra-indicações:** FONTOLAX<sup>®</sup> não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

**Precauções:** Embora não exista registro de nenhum caso, recomenda-se o controle quanto ao seu uso na gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses. (Veja item Precauções nas Informações Técnicas).

•Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento com FONTOLAX<sup>®</sup>.

•**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

•**Características:** FONTOLAX<sup>®</sup> é um laxativo que provoca ativação fisiológica das secreções mucosas, nos diversos estágios do trato digestivo, mantendo todas as características da função intestinal normal, sem provocar irritações ou gases.

FONTOLAX<sup>®</sup> possui em sua composição, de forma equilibrada, diversos componentes de ação laxante:

**Nomenclatura oficial:** *Cassia angustifolia* Vahl

**Família:** leguminosae.

**Partes usadas:** folhas.

- o Sene possui como princípios ativos os senosídeos A e B, a aloe-emodina e o ácido catártico, que atuam no intestino, umidificando as fezes e promovendo um efeito laxativo com latência de 5 a 7 horas de defecação.

**Nomenclatura oficial:** *Cassia fistula* Linné

**Família:** leguminosae.

**Partes usadas:** folhas.

- a Cassia Fistula também apresenta ação laxativa e, dados sugerem sua eficiência na prevenção de cálculos renais.

**Nomenclatura oficial:** *Tamarindus indica* Linné

**Família:** leguminosae.

**Partes usadas:** polpa/fruto.

- o Tamarindo apresenta substâncias ativas de natureza ácida (ácido tartárico, ácido málico, ácido oxálico) que atuam também como laxativos.

**Nomenclatura oficial:** *Cloriandrum sativum* Linné

**Família:** umbelliferae.

**Partes usadas:** fruto.

- o Coentro possui ação antiespasmódica e impede as manifestações eventuais de cólicas.

**Nomenclatura oficial:** *Periandra mediterrânea* Taubert


**Família:** leguminosae.


**Partes usadas:** raiz.


- O Alcaçuz possui ação laxativa e diurética.

Todos esses componentes ativos reunidos produzem os efeitos desejados, em concentrações relativamente baixas, devido à ação conjunta dos mesmos, sem os inconvenientes de efeitos colaterais.

É apresentado na forma de cápsulas gelatinosas moles, facilitando sua administração e sua absorção.

 **Indicações:** Na prisão de ventre crônica ou momentânea devido a viagens, menstruação, gestação, dietas, cirurgias e alterações dos hábitos alimentares.

 **Contra-indicações:** **Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. O produto é contra-indicado em casos de dores abdominais de etiologia desconhecida, nos processos inflamatórios abdominais, como cistite, apendicite, peritonite e endometrite, oclusão intestinal ou quando existir contra-indicação ao uso de laxantes.**


 **Precauções e advertências:** **Gerais** – embora não exista registro de nenhum caso, recomenda-se controle quanto ao seu uso na gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses.


**Gravidez** – Recomenda-se o controle quanto ao uso do produto na gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses.

**Lactação** – Informe ao médico se está amamentando.

**Pediatria** – Não é recomendado para o uso em crianças menores de 8 anos.

**Geriatría (idosos)** – Deve-se seguir as mesmas orientações dos adultos.

 **Interações medicamentosas:** O uso concomitante do produto com outras substâncias de natureza laxante deve ser orientado pelo médico.

 **Reações adversas:** **Podem ocorrer, esporadicamente, cólicas abdominais, diarreias ou vômitos. Estes sintomas desaparecem com a suspensão do medicamento ou ajuste na sua dose, adaptada ao paciente de forma individual.**

 **Posologia:**

**Adultos:** 1 a 2 cápsulas à noite, ao deitar.

**Crianças acima de 8 anos:** 1 cápsula, à noite, ao deitar.

O aumento da dose deve ser acompanhado pelo médico.